

برنام آنگد جان راکرت آموزشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

بیست و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی

فهرست

۲	پاتولوژی دهان و فک و صورت.....
۴	رادیولوژی دهان و فک و صورت.....
۶	جراحی دهان و فک و صورت.....
۹	ارتودانتیکس.....
۱۲	سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی.....
۱۳	دندانپزشکی کودکان.....
۱۷	اندودانتیکس.....
۱۹	پروتزهای دندانی - ثابت.....
۲۰	پروتزهای دندانی کامل.....
۲۲	پروتزهای دندانی- پارسیل.....
۲۴	پریودونتیکس.....
۲۶	دندانپزشکی ترمیمی.....
۲۹	بیماری‌های دهان.....
۳۱	مواد دندانی.....
۳۲	زبان تخصصی.....
۳۶	کلید نهایی.....

۱۳۹۰/۵/۶

iranpuyesh.ir

سامانه پژوهشی ایران پویش

پاتولوژی دهان و فک و صورت

۱- احتمال بروز ماکروگلوپسیا در کدام یک از اختلالات زیر بیشتر است؟

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| الف) Hyperthyroidism | ب) Hypothyroidism |
| ج) Hyperparathyroidism | د) Hypoparathyroidism |

۲- تجمع گلیکوز آمینوگلیکان در فولیکول دندان همراه با تعداد زیادی دندان نهفته در کدام یک از اختلالات زیر مشاهده می‌شود؟

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| الف) Cleidocranial dysplasia | ب) Hunter syndrome |
| ج) Gaucher disease | د) Gardner syndrome |

۳- پالپیت هیپرپلاستیک مزمن از نظر هیستوپاتولوژی مشابه کدام یک از ضایعات زیر است؟

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| الف) Pyogenic granuloma | ب) Irritation fibroma |
| ج) Giant cell granuloma | د) Giant cell fibroma |

۴- کدام ویروس می‌تواند نمای nuclear beading در هسته سلول‌های اپی‌تلیالی آلوده را ایجاد کند؟

- | | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| الف) HSV | ب) HPV | ج) CMV | د) EBV |
|----------|--------|--------|--------|

۵- کدام یک از ضایعات زیر پیش‌بدخیم نمی‌باشد؟

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| الف) Actinic cheilosis | ب) Actinic Keratosis |
| ج) Nicotinic stomatitis | د) Submucous fibrosis |

۶- کدام یک از انواع بالینی Basal cell carcinoma در تشخیص افتراقی با اسکرودرمی موضعی قرار می‌گیرد؟

- | | |
|----------------|---------------------|
| الف) Pigmented | ب) Superficial |
| ج) Morpheaform | د) Noduloulcerative |

۷- کدام یک از تومورهای بزاقی در وضعیت High grade در تشخیص افتراقی با SCC قرار می‌گیرد؟

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| الف) Acinic cell adenocarcinoma | ب) Mucoepidermoid carcinoma |
| ج) Adenoid cystic carcinoma | د) Metastasizing mixed tumor |

۸- در کدام یک از تومورهای بزاقی اپی‌تلیوم غددی و سلول‌های میوآپیتلیال در یک استرومای شبه مزانشیمی دیده می‌شود؟

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| الف) Canalicular adenoma | ب) Pleomorphic adenoma |
| ج) Basal cell adenoma | د) Sebaceous adenoma |

۹- در سندرم PHACE (s) کدام یک از انواع همانژیوم دیده می‌شود؟