

برنام آنگه جان را کثرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

بیست و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی

فهرست

۲	اندودانتیکس.....
۴	ارتودانتیکس.....
۶	آسیب شناسی دهان و فک و صورت.....
۸	پروتز دندانی.....
۱۲	پریودنتیکس.....
۱۵	بیماری دهان و فک و صورت.....
۱۷	جراحی دهان و فک و صورت.....
۱۹	ترمیمی.....
۲۲	دندانپزشکی کودکان.....
۲۴	رادیولوژی دهان و فک و صورت.....
۲۶	جامعه نگار.....
۲۷	مواد دندانی.....
۲۹	زبان انگلیسی.....
۳۴	کلید نهایی.....

۱۳۹۴/۳/۲۵

iranpuyesh.ir

سامانه پژوهشی ایران پویش

اندودانتیکس

۱- شایع ترین عامل تغییر رنگ تاجی دندان کدام است؟

- (الف) مواد پرکننده کانال
(ب) بقایای بافت پالپی
(ج) داروهای داخل کانال
(د) ترمیم های تاجی

۲- در شکست افقی ناحیه میانی و یک سوم اپیکالی ریشه نوع و مدت اسپلینت به ترتیب کدام است؟

- (الف) rigid – ۴ تا ۸ هفته
(ب) rigid – ۲ تا ۴ هفته
(ج) semi rigid – ۶ تا ۸ هفته
(د) semi rigid – ۲ تا ۴ هفته

۳- فرز Endo Z به چه منظور استفاده می شود؟

- (الف) جلوگیری از پرفوراسیون کف اتاقک پالپ
(ب) نفوذ به داخل پرسنل
(ج) نفوذ به داخل سقف اتاقک پالپ
(د) نفوذ به داخل فلز روکش

۴- برای درمان ریشه دندان مولر اول پایین تزریق تنه ای انجام شده، بی حسی بافت نرم به دست آمده است اما بیمار حین تراش عاج جهت رسیدن به پالپ درد دارد، راه حل پیشنهادی کدام است؟

- (الف) تزریق تنه ای مجدد
(ب) تزریق Gow Gates
(ج) تزریق PDL و داخل استخوانی
(د) تزریق داخل پالپی

۵- هنگام کاربرد فایل های دستی کدام تکنیک آماده سازی کانال، بیشترین توانایی حفظ مرکزیت کانال (canal centering) را دارد؟

- (الف) Crown Down
(ب) Balanced Force
(ج) Step Down
(د) Step Back

۶- عفونت خارج ریشه ای ناشی از کدام یک از میکروارگانیسم های زیر فقط با جراحی پری رادیکولار قابل درمان است؟

- (الف) لاکتوباسیل
(ب) پیتواسترپتوکوک
(ج) اکتینومایسس
(د) انتروکوکوس فوکالیس

۷- سلول های دندریتیک در کدام ناحیه از پالپ نرمال، تراکم بیشتری دارند؟

- (الف) اطراف الیاف عصبی
(ب) ناحیه پره دنتین
(ج) داخل توبول های عاجی
(د) لایه ادنتوبلاستی و اطراف عروق خونی

۸- بافت سماني که تمام طول ریشه دندان های انسایزور و کانین را می پوشاند، کدام است؟

- (الف) سمان اولیه اسلولار حاوی الیاف داخلی
(ب) سمان ثانویه حاوی الیاف داخلی
(ج) سمان اولیه سلولار حاوی الیاف خارجی
(د) سمان ثانویه اسلولار و بدون الیاف