

۱۲۴ - خانمی با گروه خونی RH منفی و همسر RH مثبت در سن حاملگی ۲۲ هفته، نوزادی مرده

به دنیا آورد. RH نوزاد مشخص نشد. این خانم بعد از یک هفته به درمانگاه زنان مراجعه می کند. در

خصوص تجویز روگام به این خانم کدام یک از گزینه های ذیل درست است؟

الف) کوامیس مستقیم را بررسی می کنیم اگر مثبت بود ۳۰۰ میکروگرم روگام تجویز می کنیم

ب) بیش از ۷۲ ساعت از زایمان گذشته است تجویز روگام فایده ای ندارد

ج) چون بچه مرده و سن حاملگی پایین است، لذا تجویز روگام لزومی ندارد

د) کوامیس غیر مستقیم را بررسی می کنیم اگر منفی بود ۳۰۰ میکروگرم روگام تجویز می کنیم

مغز و اعصاب

۱۲۵ - آقای ۶۲ ساله ای ناگهان دچار سردرد، استفراغ و کاهش سطح هوشیاری شده است. در سابقه

پرفشاری خون دارد. در معاینه در وضعیت کوما به سر می برد، مردمک ها قرینه، کوچکتر از طبیعی

و پاسخ به نور دارند. چشم ها به سمت پایین و داخل منحرف شده اند. خونریزی مغزی در کدام یک

از مناطق زیر را انتظار دارید؟

الف) پونامن

ب) تالاموس

ج) پونز

د) لوب فرونتال

۱۲۶ - خانم ۴۰ ساله ای به علت نارسایی تنفسی و فلج چهار اندام در آی سی یو بستری شده است.

شکایات وی از شب قبل از مراجعه به صورت تاری دید، دیسفاژی و سپس ضعف هر دو اندام فوقانی

شروع شده است. در معاینه مردمک ها به نور پاسخ نمی دهند. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) میاستنی گراو

ب) گیلن باره

ج) بوتولسم

د) دیفتری

۱۲۷- خانم ۲۸ ساله ای از سه روز قبل دچار ضعف هر دو اندام تحتانی به صورت پیشرونده شده است به طوری که در حال حاضر قادر به راه رفتن نمی باشد. در ارزیابی نرولوژیک کوادری پارزی

۲

در حد ۵-، ضعف عضلات فلکسور گردن و عضلات دو طرف صورت و آرفلکسی ژنرالیزه دارد.

بیمار از کدام یک از اقدامات زیر سودی نخواهد برد؟

الف) متیل پردنیزولون وریدی

ب) تعویض پلاسما

ج) ایمن گلوبولین وریدی

د) بستری در آی سی یو

۱۲۸- آقای ۵۰ ساله ای به علت زمین خوردن های مکرر از ۹ ماه قبل آورده شده است. در معاینه دیزآرتری دارد و بی مورد گریه می کند. به صورت ارادی توانایی نگاه عمودی رو به پایین ندارد ولی به صورت رفلکسی و در مانور اکولوسفالیک نگاه رو به پایین سالم است. رژیدیتی و کندی حرکات دارد و هنگام راه رفتن گردن راست و قامت کشیده است. کدام یک از تشخیص های زیر

بیشتر مطرح است؟

الف) بیماری بارکلیسون

ب) دژنراسیون کورتیکوبازال

ج) بیماری لوی بادی

د) فلج فوق هسته ای پیشرونده

۱۲۹- بیماری به علت ضعف انگشتان دست مراجعه کرده است. در معاینه بی حسی انگشت میانی، ضعف در اکستنسور انگشتان و از دست رفتن رفلکس تری سپس دارد. کدام ریشه نخاعی درگیر است؟

الف) C5

ب) C6

ج) C7

د) C8