

داخلی

۱- آقای ۶۷ ساله سیگاری Heavy smoker با تنگی نفس، تاکی پنه، ادم اندام‌های تحتانی و JVP برجسته، بستری شده‌اند. در اکوکاردیوگرافی انجام شده فشار شریان پولمونر بالاست. کدامیک از اقدامات زیر ارزش کمتری در درمان بیمار دارد؟

(۱) اکسیژن درمانی

(۲) دیگوکسین

(۳) دیورتیک

(۴) برونکودیلاتور

۲- خانم ۶۲ ساله مبتلا به دیابت تیپ ۲ که تحت درمان دارویی بوده است با درد اپیگاستر به اورژانس مراجعه نموده است. در ECG بیمار ST elevation در لیدهای تحتانی قلب مشهود است. بیمار ناگهان دچار افت فشار خون و برادیکاردی می‌شود، ولی در سمع ریه‌ها پاک است. اولین اقدام درمانی شما کدام است؟

(۱) تجویز نیتروگلیسرین وریدی

(۲) تجویز سرم نرمال سالین

(۳) تجویز ایزوپرتنول وریدی

(۴) تعبیه پیس میکر موقت

۳- همه بیماری‌های قلبی زیر سوفل هولوسیستولیک می‌دهد. بجز:

(۱) (MR) نارسایی دریچه میترا

(۲) (TR) نارسایی دریچه تریکوسپید

(۳) (ASD) نقص سپتوم بین دهلیزی

(۴) (VSD) نقص سپتوم بین بطنی