

۱۶۹. مصرف داروی لیتیوم باعث تشدید کدام اختلال پوستی می شود؟

- الف - لیکن پلان - آکنه
- ب - آکنه - پسوریازیس
- ج - کبیر - آکنه
- د - پسوریازیس - لیکن پلان

۱۷۰. بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی متعقد است که همسرش به وی خیانت می کند، شیوه ارتباطی مناسب در برخورد با این بیمار کدام است؟

- الف - ابتدا با وی همفکری و بعداً اشتباهش را گوشزد می کنیم.
- ب - توصیه به طلاق و جدایی موقت اقدام مناسبی می باشد.
- ج - از بحث مستقیم با بیمار در این مورد خودداری می کنیم.
- د - در مصاحبه با همراهان، مدارکی برای رد اعتقاد او پیدا کرده و با بیمار مطرح می کنیم.

۱۷۱. آقای ۳۵ ساله با حالت خواب آلودگی و تکلم مبهم به اورژانس آورده شده است. در معاینه فشار خون پایین، کاهش ضربان قلب، کاهش صداهای روده ای و ومردمک Pinpoint وجود دارد. داروی انتخابی کدام است؟

- الف - کلردیازپوکساید
- ب - تیامین
- ج - نالوکسان
- د - هالوپریدول

پوست

۱۷۲. خانم ۲۵ ساله با ضایعات پوستی تنه و پروکسیمال اندام از حدود ۲ هفته قبل مراجعه نموده است. در معاینه بالینی ضایعات به شکل پلاک های بیضوی همراه با پوسته های ظریف در حاشیه می باشند. ضایعات بیمار فاقد خارش بوده و شروع ضایعات با پلاک بزرگ اولیه (Herald Patch) در ناحیه پروکسیمال ران بوده است. تشخیص شما چیست؟

- الف - پسوریازیس قطره ای
- ب - تینا ورسیکالر
- ج - پیتریازیس روزآ
- د - واکنش دارویی

۱۷۳. در واکنش دارویی کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

- الف - مکانیسم های ایمنولوژیک از غیر ایمنولوژیک در ایجاد واکنش های دارویی شایع تر هستند.
- ب - در واکنش دارویی ثابت (fixed drug eruption) ناحیه گلانز پنیس شایع ترین محل درگیری می باشد.
- ج - شایع ترین فرم واکنش دارویی نوع موربیلنرم (ماکولوپایولر) می باشد.
- د - اسپرین و بنی سلین علل اصلی واکنش های دارویی کبیری می باشند.