

۵۶- بیماری ۳۶ ساله مبتلا به بیماری هوچکین دچار هیپرکالسمی علامت دار شده است ، اولین اقدام کدام است ؟
 الف) تجویز فورسماید
 ب) تجویز کالسی تونین
 ج) تجویز پامیدرونات
 د) انفوزیون محلول سالیین نرمال

۵۷- یک مرد ۶۵ ساله با سابقه بیماری دیورتیکولوز با تشخیص دیورتیکولیت بستری می شود. علائم بیمار با مایع درمانی و تجویز آنتی بیوتیک پس از ۷۲ ساعت بهبودی نمی یابد . اقدام مناسب بعدی کدام است ؟
 الف) باریم انما یا کنتراست هوا
 ب) سی تی اسکن شکم و لگن
 ج) سیگموئیدسکوپی
 د) کولونوسکوپی

۵۸- یافته های تصویری در سی تی اسکن و MRI شکم یک خانم ۲۵ ساله به نفع آدنوم منفرد کبدی می باشد . در بررسی اسکن هسته ای توده مذکور Cold گزارش شده است . درمان مناسب کدام است؟
 الف) درمان رادیوفرکوتنسی
 ب) تزریق الکل از راه پوست
 ج) کمو آمبولیزاسیون
 د) رزکسیون جراحی

۵۹- در رابطه با Gastrointestinal stromal tumor کدام مورد نادرست است ؟

- الف) متاستاز آن بیشتر از طریق غدد لنفاوی است .
 ب) دو سوم کل موارد تومور در معده ایجاد می شود.
 ج) با FNA می توان آن را از لیومیوما افتراق داد.
 د) Imatinib داروی موثر بر این تومور می باشد.

۶۰- خانم ۶۰ ساله ای با نبض نامنظم و سردی یک طرفه اندام تحتانی و عدم لمس نبض اندام مراجعه نموده است پس از تجویز هپارین مناسب ترین اقدام کدام است.

- الف) آنژیوگرافی
 ب) انتقال بیمار به اطاق عمل
 ج) CT آنژیوگرافی
 د) سونوگرافی داپلر

۶۱- خانم جوانی ۱۲ ساعت پس از جراحی تیروئید کتومی ساب توتال دچار بیقراری و مشکل تنفسی شده است در معاینه تاقیکارد بوده و تورم در ناحیه قدامی گردن مشاهده می شود. پانسمان محل جراحی خشک و تمیز است . اقدام مناسب در شرایط ذکر شده چیست؟

- الف) تعبیه لوله تراشه
 ب) باز کردن برش جراحی
 ج) اندازه گیری کلسیم خون
 د) تجویز مورفین

۶۲- نوزاد ۲۱ روزه ای با استفراغ های جهنده غیر صفراوی مراجعه نموده است در معاینه شکم برجستگی در اپیگاستر قابل لمس است اقدام بعدی کدامست؟

- الف) اصلاح آب و الکترولیت و سپس عمل جراحی
ب) سونوگرافی
ج) جراحی اورژانس
د) Upper GI series

۶۳- آقای ۳۲ ساله ای با ندول تیروئید که در بیوپسی سوزنی ضایعه فولیکولر گزارش شده است در اسکن رادیوایزوتوپ ندول سرد گزارش شده است. اقدام بعدی کدامست؟

- الف) تیروئیدکتومی
ب) تکرار بیوپسی
ج) استفاده از ید رادیواکتیو
د) با هورمون تیروئید درمان می کنیم.

۶۴- مرد جوانی به دنبال تصادف دچار مولتی پل تروما شده و علائم حیاتی بیمار BP: $\frac{70}{50}$ ، PR: $\frac{140}{min}$ ، RR: $\frac{22}{min}$ می باشد در معاینه Racon eyes دارد و ورید ژوگولار برجسته و آثار کبودی و خراشیدگی و آمفیزم زیر جلدی درهمی توراکس راست و شکم دارد کدام اقدام اولویت دارد؟

- الف) لاپاراتومی تجسسی
ب) پریکاردیوستنژ در اورژانس
ج) انجام سی تی اسکن مغز
د) کارگذاری Chest Tube

۶۵- خانم ۴۰ ساله با شکایت از توده پستان مراجعه نموده است. سابقه کانسرپستان در مادر بیمار وجود دارد و در معاینه توده با حدود نامنظم 3*2 cm در پستان چپ لمس می شود، ماموگرافی ، سونوگرافی ، بیوپسی سوزنی یافته ای به نفع بدخیمی ندارد. اقدام مناسب کدام است.

- الف) درمان با تاموکسیفن
ب) MRI پستانها
ج) بیوپسی باز
د) اطمینان دادن به بیمار و پیگیری

۶۶- بیماری با سوختگی ۱۰٪ درجه اول و ۳۰٪ سوختگی درجه دوم و ۱۰٪ سوختگی درجه سوم مراجعه نموده ، وزن بیمار ۵۰ کیلوگرم است. چه مقدار مایع در ۲۴ ساعت اول نیاز دارد؟

۳۰۰۰ سی سی

- الف) ۶ لیتر
ب) ۸ لیتر
ج) ۱۰ لیتر
د) ۷ لیتر

۶۷- آقای ۲۶ ساله به علت سقوط از ارتفاع دچار تروما به سر گردیده است. در معاینات اولیه انجام یافته ، بیمار انتوبه می باشد. با تحریک دردناک چشمها را باز می کند و درد را لوکالیزه می کند GCS (اسکور کوما ی گلاسکو) بیمار چند می باشد؟

- الف) ۸
ب) 8(T)
ج) 7(T)
د) ۷