

برنام آنگ آرام نیش دلمانت  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی  
کمیته آموزشی قطب زاگرس

## پنجاه و پنجمین دوره آزمون جامع پیش کارورزی پزشکی

پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

(دفترچه ب)

|                          |
|--------------------------|
| تعداد سوال : ۲۲۵         |
| تعداد صفحه : ۴۰          |
| زمان پاسخگویی: ۲۲۵ دقیقه |

### مشخصات داوطلب

نام: .....

نام خانوادگی: .....

شماره کارت: .....

شماره دانشجویی: .....

### تذکرات مهم:

- برای هر سوال، تنها گزینه‌ای را که بهترین پاسخ ممکن است انتخاب نمایید.
- این آزمون نمره منفی ندارد.
- قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد سوالات و صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و حروف گروه پاسخنامه خود را با حروف گروه دفترچه (الف و ب) مطابقت دهید. در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید. در غیر این صورت پس از پایان آزمون هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

## جراحی

۱. مرد ۲۶ ساله‌ای در اثر سقوط از ارتفاع دچار تروما به سر شده و بیمار انتوبه شده است. در معاینه با تحریک دردناک چشم‌ها را باز کرده و درد را لوکالیزه می‌کند. GCS بیمار چند است؟

- الف - ۸  
ب - ۷  
ج - ۸(T)  
د - ۷(T)

۲. بیمار آقای ۲۲ ساله به دنبال تصادف با موتورسیکلت به اورژانس آورده شده است. بیمار هوشیار کامل و از درد شکم شاکی است. در معاینه تندرns و ریباند تندرns ژنرالیزه شکمی دارد. کدام اقدام توصیه می‌شود؟

- الف - لاپاراتومی اورژانس  
ب - سونوگرافی FAST  
ج - CT Scan شکم با کنتراست سه گانه  
د - تحت نظر گرفتن و معاینه سریال توسط جراح

۳. خانم ۳۲ ساله با درد RLQ در اورژانس بستری شد. در شرح حال وی بی‌اشتهائی، تهوع و استفراغ وجود دارد. در معاینه بیمار حساسیت در RLQ دارد. در آزمایشات خون محیطی گلبول سفید ۱۲۰۰۰ گزارش شده است. اولین اقدام مناسب کدام است؟

- الف - سونوگرافی شکم و لگن  
ب - سی تی اسکن شکم و لگن  
ج - آپاندکتومی  
د - تحت نظر گرفتن و معاینه مجدد بیمار

۴. خانم ۴۲ ساله که در ماموگرافی میکروکلسیفیکاسیون مشکوک به بدخیمی وجود داشته ولی در معاینه بالینی فاقد توده قابل لمس است. اقدام صحیح کدام است؟

- الف - core needle biopsy تحت هدایت سونوگرافی  
ب - بیوپسی اکسیژونال باز  
ج - بیوپسی تحت تکنیک استریوتاکتیک  
د - بیوپسی انسیزونال باز

۵. در اتاق عمل در حالی که تیغ بیستوری را داخل ظرف اجسام نوک تیز انداخته‌اید یکی از سوزن‌های داخل جعبه به دست شما نفوذ می‌کند. از نظر پروفیلاکسی HIV کدام جمله صحیح است؟

- الف - شروع سریع رژیم دارویی ضد HIV  
ب - انجام تست HIV و در صورت مثبت بودن درمان دارویی  
ج - پروفیلاکسی بعد از مواجهه در هیچ شرایطی باعث کاهش ابتلا به HIV نمی‌شود.  
د - پروفیلاکسی توصیه نمی‌شود.