

۱- مرد ۲۶ ساله ای در اثر سقوط از ارتفاع دچار تروما به سر شده و بیمار انتوبه شده است. در معاینه با تحریک دروناک چشم ها را باز کرده و درد را لوکالیزه می کند. GCS بیمار چند است؟

- ۸ (A) ۱
۷ (B) ۴
۸ (T) (C) ۱
۷ (T) (D) ۴

۲- بیمار آقای ۲۲ ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت به اورژانس آورده شده است. بیمار هوشیار کامل و از درد شکم شاکی است. در معاینه تندرست و ریپاند تندرست شکمی دارد. کدام اقدام توصیه می شود؟

- (A) لاپاراتومی اورژانس
(B) سونوگرافی FAST
(C) CT Scan شکم با کنتراست سه گانه
(D) تحت نظر گرفتن و معاینه سریال توسط جراح

۳- خانم ۳۲ ساله با درد RLQ در اورژانس بستری شد. در شرح حال وی بی اشتهائی، تهوع و استفراغ وجود دارد. در معاینه بیمار حساسیت در RLQ دارد. در آزمایشات خون محیطی گلبول سفید ۱۲۰۰۰ گزارش شده است. اولین اقدام مناسب کدام است؟

- (A) سونوگرافی شکم و لگن
(B) سی تی اسکن شکم و لگن
(C) آپاندکتومی
(D) تحت نظر گرفتن و معاینه مجدد بیمار

۴- خانم حامله ۲۳ هفته با شکایت از توده پستان راست مراجعه و در بررسی تشخیص کانسر پستان داکتال کارسینوم مهاجم stag II بوده اقدام درمانی مناسب کدام است؟

- (A) ختم حاملگی و انجام جراحی رادیکال ماستکتومی مدیفیه
(B) لامپکتومی و انجام شیمی درمانی و رادیوتراپی
(C) ختم حاملگی و انجام جراحی (MRM) و شیمی درمانی - رادیوتراپی بعد از عمل
(D) انجام جراحی رادیکال ماستکتومی مدیفیه MRM و شیمی درمانی

۵- در خانمی ۵۵ ساله با شکایت از توده در پستان چپ مراجعه کرده است شک کلینکی قویا به نفع بدخیمی بوده بیوپسی سوزن Core needle biopsy انجام شده و جواب پاتولوژی خوش خیم است اقدام بعدی کدام است؟

- (A) اقدام خاصی لازم نیست
(B) با توجه به شک بالینی لازم است بیوپسی باز انجام شود
(C) مجددا بیوپسی سوزن انجام می شود
(D) ۳ ماه دیگر مجددا بیمار بررسی می شود

۶- میزان مورد نیاز سرم برای نوزاد ترم ۲ روزه مبتلا به گاستروشنزی با وزن ۲ کیلوگرم کدام است؟

- (A) ۵۰۰ میلی لیتر
(B) ۲۰۰ میلی لیتر
(C) ۲۵۰ میلی لیتر
(D) ۱۵۰ میلی لیتر

۷- در نوزاد ۲ روزه با اتساع شکم، عدم دفع مکنیوم رادیوگرافی ساده شکم در وضعیت ایستاده گرفته شده است که اتساع لوپهای روده بدون سطح مایع هوا می باشد کدام تشخیص محتملتر می باشد؟

- (A) آترزی ژوژنوم
(B) ایلئوس مکنیال
(C) آترزی ایلئوم
(D) آترزی کولون

۸- در ارزیابی بیمار مبتلا به آپاندیسیت با معیار آلوارادو کدام علامت ارزش بیشتری دارد؟

- (A) Migration of pain
(B) Right lower quadrant Tenderness
(C) Anorexia
(D) Rebound

۹- در بیماران که Splenectomy شده اند شانش بروز Overwhelming postsplenectomy Infection (OPSI) در کدام کمتر است؟

- (A) اسپلنکتومی به دنبال تروما
(B) اسفروسیتوز
(C) تالاسمی
(D) در بیمار مبتلا به میلودیسپلازی

۱۰- خانم ۶۵ ساله با ایکتر و درد فوقانی راست شکم و تب مراجعه کرده است در سونوگرافی اتساع و سنگ ریزه در کیسه صفرا گزارش شده، قطر کلدوک ۱۴ میلیمتر و یک سنگ انتهای آن دارد. علیرغم سرم درمانی و آنتی بیوتیک، علائم ادامه دارد اقدام مناسب را انتخاب کنید؟

- (A) تغییر رژیم آنتی بیوتیک
(B) درناژ از طریق کبد (PTC)
(C) درناژ اندوسکوپی (ERCP)
(D) درناژ کیسه صفرا (کله سیستوستومی)

۱۱- کدام بیمار دچار انسداد روده به علت ضایعه اینترامورال شده است؟

- (A) بیماری که فتق اینگوینال کرده است
(B) بیماری که انسداد در زمینه بیماری کرون ایجاد شده است
(C) بیماری که انسداد به علت گیر کردن سنگ صفرا در ایلئوم دارد
(D) بیماری که به علت ولولوس دچار انسداد شده است

۱۲- بیمار ۴۵ ساله با درد شدید شکمی حداکثر در LLQ تندرین- تب مراجعه کرده است بررسی آزمایشگاهی لوکوسیتوز داشته شک بالینی دیورتیکولیت بود با انجام CT اسکن تشخیص قطعی می شود اقدام بعدی کدام است؟

- (A) رژیم Low Residu + آنتی بیوتیک و بصورت سرپایی پیگیری می کنیم
(B) بیمار در بیمارستان بستری و جهت تشخیص قطعی کولونوسکوپی می شود
(C) بیمار بستری و تحت لاپاراتومی قرار می گیرد
(D) بیمار در بیمارستان بستری و رژیم low residu + آنتی بیوتیک وسیع الطیف