

جراحی

۱) شروع درمان با آلبومین در بیماران سوختگی از چه زمانی است؟

A. ۱۶ ساعت اول

B. ۸ ساعت دوم

C. ۲۴ ساعت اول

D. ۲۴ ساعت دوم

۲) خانم ۶۰ ساله با حملات مکرر درد قسمت فوقانی چپ شکم و احساس نفخ و آروغ زدن مراجعه کرده است. در

سونوگرافی سنگ صفرا بدون عارضه دیده میشود. اقدام بعدی کدام است؟

A. رادیوگرافی شکم

B. تکرار سونوگرافی

C. آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

D. کولهسیستکتومی اورژانس

۳) خانم ۴۰ ساله در غربالگری (screening) با ماموگرافی، توده‌ای یک سانتیمتری با clustered microcalcification در

پستان راست دارد. بیمار هیچ گونه شکایتی نداشته و معاینه پستان و زیر بغل نرمال دارد. بهترین اقدام کدام است؟

A. مراجعه و ویزیت ۶ ماه آینده

B. ارجاع جهت بیوپسی از توده

C. درخواست MRI از پستان

D. علامت خوش خیم است اقدامی نیاز ندارد

۴) بیمار آقای ۲۴ ساله که بدنبال نزاع دچار ترومای نافذ شکم با گلوله اسلحه کمربند در ۳ سانتی متری بالای ناف شده

است. پس از اقدامات اولیه احیا کدام اقدام را توصیه می کنید؟

A. لاواژ تشخیص بریتون (DPL)

B. سی تی اسکن شکم و ادامه درمان بر اساس آن

C. سونوگرافی FAST در صورت وجود مایع آزاد در شکم انتقال به اتاق عمل

D. انتقال بیمار به اتاق عمل برای انجام لاپاروتومی

۵) تغییرات الکتروکاردیوگرافیک در کدامیک از اختلال الکترولیتی زیر مشابه هیپرکالمی است؟

A. هیپوکالمی

B. هیپومنیزمی

C. هیپرکالمی

D. هیپرمنیزمی