

۶۶- مرد ۳۵ ساله ای بدلیل تصادف و ترومای شدید قفسه سینه به اورژانس آورده شده است  $BP=110/;BP=$   $PR=35/80/60$  - بیمار بشدت آژینه و بی قرار است در معاینه قلب نرمال دیده می شود کاهش صداهای ریوی در نیم سینه راست. همراه با آمنفیزم زیر جلدی راست و ورید گردنی برجسته است برای کنترل آژیتاسیون این بیمار چه اقدامی لازم است؟

الف) تعبیه چست نیوب در نیم سینه راست

ب) تجویز دیازپام وریدی

ج) تجویز سی تی اسکن قفسه سینه و شکم و سپس اقدام براساس آن

د) تجویز مورفین وریدی

۶۷- آقای ۳۰ ساله ای با درد اپی گاستر به اورژانس مراجعه کرده است درد بتدریج در RLQ متمرکز شده است یکبار استفراغ داشته و بی اشتهائی را هم ذکر می کند  $WBC=9000, Neut=90\%$  است تب low grad دارد تصمیم شما چیست؟

الف) کولونوسکوپی اورژانس

ب) با آنتی بیوتیک و مسکن مرخص شود

ج) جراحی اورژانس و ایاندکتومی

د) سی تی اسکن شکم و لگن

۶۸- آقای ۵۶ ساله ای با خونریزی گوارشی فوقانی تحت آندوسکوپی قرار گرفت که واریس های روده گزارش گردید. بعلت عدم کنترل آندوسکوپی یک خونریزی بیمار کاندید جراحی شده است در صورت سابقه بیمار بستری به علت پانکراتیت شدید از ۶ ماه قبل دارد علاوه بر کنترل خونریزی کدام اقدام می بایست انجام شود؟

الف) واگنومی

ب) پانکراکتومی

ج) اسپلنکتومی

د) کله سیستکتومی

۶۹- کدامیک از گزینه های زیر از معیارهای شوک grade II نمی باشد؟

الف) وجود هیپوتانسیون شدید

ب) از دست دادن  $1000\text{cc}$  حجم خون

ج) تاکیکاردی در حد ۱۱۰ ضربه در دقیقه

د) از دست دادن حدود ۲۵٪ حجم خون

۷۰- کدام یک از زخم های زیر **contaminated** محسوب می شود؟

الف) کله سیستکتومی برای سنگ صفراوی علامتدار

ب) تراکتوستومی

ج) دیورنیکول پرفوره

د) بریدگی انگشت در جریان پاک کردن سبزی توسط خانم خانه دار

۷۱- بیمار ۴۵ ساله ای با تشخیص ندول تیروئید و سابقه تیروئیدکتومی به علت کارسینوم پاپیلری در برادر خود تحت FNA قرار گرفته است که کلونید گزارش شده است. اقدام مناسب کدام است؟

الف) تیروئیدکتومی توتال ✓

ب) لوئیکتومی و ایسکتومی

ج) تکرار FNA ۶ ماه بعد

د) درمان با لووتیروکسین

۷۲- آقای ۴۰ ساله ای که از یک حادثه آتش سوزی نجات یافته است به اورژانس آورده شده است بیمار دچار تاکی پنه و بی قراری است سمع ریه wheeze منتشر دارد در معاینه پوست بدن بیمار سالم است اولین اقدام شما چیست؟

الف) اسپرومتری

ب) تراکتوسنومی قوری

ج) برونکوسکوپی

د) Blood Gas ✓

۷۳- شروع درمان با آلبومین در بیماران سوختگی از چه زمانی است؟

الف) ۱۶ ساعت اول

ب) ۸ ساعت دوم

ج) ۲۴ ساعت اول

د) ۲۴ ساعت دوم ✓

۷۴- خانم ۶۰ ساله با حملات مکرر درد قسمت فوقانی چپ شکم و احساس نفخ و آروغ زدن مراجعه کرده است. در سونوگرافی سنگ صفرا بدون عارضه دیده میشود. اقدام بعدی کدام است؟

الف) رادیوگرافی شکم

ب) تکرار سونوگرافی

ج) اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی ✓

د) کوله سیستکتومی اورژانس -

۷۵- خانم ۴۰ ساله در غربالگری (screening) با ماموگرافی، توده‌ای یک سانتیمتری با clustered microcalcification در پستان راست دارد. بیمار هیچ گونه شکایتی نداشته و معاینه پستان و زیر بغل نرمال دارد. بهترین اقدام کدام است؟

الف) مراجعه و ویزیت ۶ ماه آینده

ب) ارجاع جهت بیوپسی از توده ✓

ج) درخواست MRI از پستان

د) علامت خوش خیم است اقدامی نیاز ندارد