

### جراحی عمومی

۱- مرد ۶۷ ساله ای با علائم دیسفاژی و برگشت غذای هضم نشده (Regurgitation) مراجعه کرده است. بیمار سابقه عفونت های مکرر تنفسی را نیز ذکر می کند، اما توده ای در گردن لمس نمی شود. بهترین روش تشخیصی کدام است؟

الف- رادیوگرافی با بلع باریم

ب- اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش

ج- برونکوسکوپی

د- مانومتري مری

۲- بیمار آقای ۲۵ ساله با علائم تهوع، استفراغ، عدم دفع گاز و مدفوع و بدون تب مراجعه کرده است. وی سابقه لاپاراتومی در ۳ سال قبل را ذکر می کند. در معاینه شکم، تندرست دارد و در آزمایش خون وی: WBC: 20000 است. مهم ترین اقدام درمانی کدام است؟

الف- سونوگرافی شکم

ب- بلع باریم

ج- لاپاراتومی اورزانس

د- تحت نظر و معاینه مجدد ۶ ساعت بعد

۳- خانم ۳۰ ساله به علت توده پستان راست مراجعه کرده است. در معاینه، توده متحرک به ابعاد ۳\*۳ سانتی متر لمس می شود. در سونوگرافی، کیست پستان گزارش شده که پس از آسپیره، حدود ۱۵ سی سی مایع خونی خارج شده است. کدام اقدام بعدی ارجح است؟

الف- ماموگرافی

ب- تجویز داروی ضد التهاب و ارزیابی ۲ ماه بعد

ج- بیوپسی

د- ارجاع برای لامبکتومی (برداشتن توده)

۴- کدامیک از تومورمارکرهاي زیر را به طور اختصاصی در کانسرهای کولورکتال جهت پیگیری روند درمان استفاده می کنید؟

الف- CA15-3

ب- CA125

ج- CEA

د- CA19-9