

داخلی (۴۹ سؤال)

سؤال ۱- مردی ۳۵ ساله بدون علامت که برادرش در سن ۵۶ سالگی مبتلا به سرطان کولون شده است به شما مراجعه کرده است. نظر شما در مورد انجام آزمایشات غربالگری در این فرد چیست؟

- (۱) از سن ۴۰ سالگی کلونوسکوپی انجام دهد و هر ۵ سال تکرار شود
- (۲) از سن ۴۰ سالگی کلونوسکوپی انجام دهد و هر ۱۰ سال تکرار شود
- (۳) از سن ۴۶ سالگی کلونوسکوپی انجام دهد و هر ۵ سال تکرار شود
- (۴) از سن ۴۶ سالگی کلونوسکوپی انجام دهد و هر ۱۰ سال تکرار شود

منبع: cecil essential سال ۲۰۱۰ صفحه ۴۴۳

سؤال ۲- خانم ۶۴ ساله با درد شدید در اپیگاستر و RUQ همراه با تهوع به اورژانس مراجعه کرده و بعد از ۴ ساعت و با تزریق مخدر وریدی درد کاهش یافت. در معاینه تندرست خفیف در اپی گاستر دارد. سونوگرافی مجاری داخل و خارج کبدی نرمال است. ضخامت کیسه صفرا طبیعی است و یک سنگ ۹ میلی متری در کیسه صفرا وجود دارد. انجام کدام مورد به عنوان اقدام بعدی مناسب است؟

- (۱) MRCP
- (۲) ERCP
- (۳) Cholecystectomy
- (۴) CT Scan

منبع: cecil essential سال ۲۰۱۰ صفحه ۴۹۱

سؤال ۳- خانم ۳۷ ساله ای با progressive dysphagia and weight loss مراجعه کرده است. در مانومتری مری فشار LES افزایش یافته می باشد و با بلع شل نمی شود. در ضمن تنه مری هم فاقد پرستالتیسم است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

- (۱) کانسر مری
- (۲) اسپاسم منتشر مری
- (۳) آشالازی
- (۴) اسکرودرمی

منبع: cecil essential سال ۲۰۱۰ صفحه ۴۱۱

جراحی

✓ ۱- مرد ۶۷ ساله‌ای با علائم دیسفاژی و برگشت غذای هضم نشده (Regurgitation) مراجعه کرده است. بیمار سابقه عفونت‌های مکرر تنفسی را نیز ذکر می‌کند، اما توده‌ای در گردن لمس نمی‌شود. بهترین روش تشخیصی کدام است؟

- (الف) رادیوگرافی با بلع باریم
- (ب) اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش
- (ج) برونکوسکوپی
- (د) مانومتری مری

✓ ۲- بیمار آقای ۲۵ ساله با علائم تهوع، استفراغ، عدم دفع گاز و مدفوع و بدون تب مراجعه کرده است. وی سابقه لاپاراتومی در ۳ سال قبل را ذکر می‌کند. در معاینه شکم، تندرست دارد و در آزمایش خون وی: WBC: 20000 است. مهم‌ترین اقدام درمانی کدام است؟

- (الف) سونوگرافی شکم
- (ب) بلع باریم
- (ج) لاپاراتومی اورژانس
- (د) تحت نظر و معاینه مجدد ۶ ساعت بعد

✓ ۳- خانم ۳۰ ساله به علت توده پستان راست مراجعه کرده است. در معاینه، توده متحرک به ابعاد ۳×۳ سانتی‌متر لمس می‌شود. در سونوگرافی، کیست پستان گزارش شده که پس از آسپیره، حدود ۱۵ سی‌سی مایع خونی خارج شده است. کدام اقدام بعدی ارجح است؟

- (الف) ماموگرافی
- (ب) تجویز داروی ضد التهاب و ارزیابی ۲ ماه بعد
- (ج) بیوپسی
- (د) ارجاع برای لامپکتومی (برداشتن توده)

✓ ۴- برای جلوگیری از Refeeding Syndrome انجام کدامیک از اقدامات زیر ضروری نیست؟

- (الف) اصلاح تدریجی و آهسته سوء تغذیه بیمار
- (ب) تجویز تیامین قبل از اصلاح سوء تغذیه
- (ج) اصلاح اختلالات آب و الکترولیت زمینه‌ای
- (د) اصلاح کامل هیپرگلیسمی بیمار با تجویز انسولین طولانی اثر قبل از شروع رژیم غذایی

✗ ۵- تابلوی بالینی هایپومنیزمی به کدامیک از اختلالات الکترولیتی زیر شباهت دارد؟

- (الف) کاهش سدیم سرم
- (ب) افزایش فسفر سرم
- (ج) کاهش کلسیم سرم
- (د) افزایش پتاسیم سرم

کلسیم = هیپومنیزمی
فسفر = هایپومنیزمی