

# به نام آنکه آرام بخش دلهاست

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


معاونت آموزشی

کمیته آموزشی قطب شماره ۱۰ کشوری

## پنجاه و هفتمین دوره آزمون جامع پیش کارورزی پزشکی

پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

(دفترچه ب)



مشخصات داوطلب

نام: .....

نام خانوادگی: .....

شماره کارت: .....

شماره دانشجویی: .....

تذکرات مهم:

- برای هر سوال، تنها گزینه ای را که بهترین پاسخ ممکن است انتخاب نمایید.
- این آزمون نمره منفی ندارد.
- قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد سوالات و صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و حروف گروه پاسخنامه خود را با حروف گروه دفترچه مطابقت دهید. در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید. در غیر اینصورت پس از پایان آزمون هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

iranpuyesh.ir

## جراحی

۱- مرد ۶۷ ساله‌ای با علایم دیسفاژی و برگشت غذای هضم نشده (Regurgitation) مراجعه کرده است. بیمار سابقه عفونت‌های مکرر تنفسی را نیز ذکر می‌کند، اما توده‌ای در گردن لمس نمی‌شود. بهترین روش تشخیصی کدام است؟

(الف) رادیوگرافی با بلع باریم

(ب) اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش

(ج) برونکوسکوپی

(د) مانومتري مری

۲- بیمار آقای ۲۵ ساله با علایم تهوع، استفراغ، عدم دفع گاز و مدفوع و بدون تب مراجعه کرده است. وی سابقه لاپاراتومی در ۳ سال قبل را ذکر می‌کند. در معاینه شکم، تندرns دارد و در آزمایش خون وی؛  $WBC: 20000$  است. مهم‌ترین اقدام درمانی کدام است؟

(الف) سونوگرافی شکم

(ب) بلع باریم

(ج) لاپاراتومی اورژانس

(د) تحت نظر و معاینه مجدد ۶ ساعت بعد

۳- خانم ۳۰ ساله به علت توده پستان راست مراجعه کرده است. در معاینه، توده متحرک به ابعاد  $3 \times 3$  سانتی‌متر لمس می‌شود. در سونوگرافی، کیست پستان گزارش شده که پس از آسپیره، حدود ۱۵ سی‌سی مایع خونی خارج شده است. کدام اقدام بعدی ارجح است؟

(الف) ماموگرافی

(ب) تجویز داروی ضد التهاب و ارزیابی ۲ ماه بعد

(ج) بیوپسی

(د) ارجاع برای لامپکتومی (برداشتن توده)

۴- در بیماری که به دلیل کرون و اعمال متعدد جراحی شکمی هم اکنون تحت تغذیه وریدی (TPN) می باشد کدام عبارت صحیح است؟

- الف) کوله سیستکتومی الکتیو به جهت بالاتر بودن میزان سنگهای صفراوی توصیه می گردد
- ب) تجویز مقدار بیشتر کربوهیدرات توصیه می گردد
- ج) استفاده از کاتتر با چند لومن جهت پایین آوردن میزان عفونت توصیه می گردد
- د) حتی الامکان مقدار کمی مایعات از طریق NGT گاوژ شود

۵- آقای ۶۲ ساله دیابتی با فیستول انتروکوتانه با ترشحات بیش از ۵۰۰cc در روز بستری و تحت TPN است. هم اکنون در آزمایشات وی

PH: ۷.۲۳

Anion Gap: ۸

Urine PH: ۴.۵

می باشد. کدام تشخیص محتمل تر است؟

- الف) دفع ترشحات از فیستول
- ب) اسیدوز توبولار کلیوی
- ج) هیپولمی و هیپوپرفیوژن
- د) کتواسیدوز دیابتی

۶- برای تصحیح اختلال انعقادی در فرد ۴۰ ساله مبتلا به سیروز کبدی کدام فرآورده را ترجیح می دهید؟

DDAVP الف)

PLT ب)

CRYO ج)

FFP د)

۷- آقای ۴۶ ساله ای نیم ساعت پس از صرف غذا دچار حملات تعریق، دل درد و تاکی کاردی می گردد. سابقه عمل جراحی به دلیل زخم معده دارد و تغییر رژیم غذایی هیچ گونه تأثیری در درمان وی نداشته است. کدام درمان را توصیه می کنید؟

Acarbose الف) شروع

Octreotide ب) شروع

ارجاع بیمار جهت جراحی مجدد ج)

اضافه کردن آب به وعده های غذایی د)