

برنام آگه آرام بخش دهاست

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سنجش کلان منطقه ۸ آمایشی

شصت و یکمین دوره آزمون پیش کارورزی

پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

(دفترچه الف)

تعداد سوالات: ۲۰۰  
تعداد صفحات: ۴۴  
زمان پاسخگویی: ۲۰۰ دقیقه

مشخصات داوطلب

نام: .....

نام خانوادگی: .....

تامین جزوات علوم پزشکی:

شماره کارت: .....

iranpuyesh.ir

شماره دانشجویی: .....

تذکرات مهم:

برای هر سوال، تنها گزینه ای را که بهترین پاسخ ممکن است انتخاب نمایید.

این آزمون نمره منفی ندارد.

قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد سوالات و صفحات به دقت مورد

بررسی قرار داده و حروف گروه پاسخنامه خود را با حروف گروه دفترچه (الف و ب) مطابقت

دهید. در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید. در غیر این صورت پس از

آزمون هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

آزمون پیش کارورزی (دفترچه الف)

داخلی

۱- خانم ۲۵ ساله ای به علت یبوست که از ۵ سال قبل شروع شده مراجعه نموده است. وی شرح حالی از کاهش وزن، آنمی، خونریزی رکتال و یا سابقه خانوادگی کانسر کولون ندارد. کدام یک از موارد زیر را برای ایشان درخواست می نمایید؟  
الف) colonoscopy

ب) Anorectal manometry

ج) Check of colon transit time

د) Check of CBC-TSH-K-Ca

۲- خانم ۴۵ ساله ای یک ساعت بعد از انجام ERCP به دلیل سنگ در CBD، دچار درد شدید شکم در ناحیه اپی گاستر، تهوع و استفراغ شده است. درد با نشستن و خم شدن به جلو کاسته می شود و درد به ناحیه بین دو کتف انتشار دارد. با توجه به شایع ترین تشخیص مطرح، محتمل ترین اقدام درمانی شما چیست؟

الف) IV octerotide

ب) IV Antibiotic

ج) Vigorous IV hydration

د) NG tube and IV PPI

۳- بیمار پسر ۱۲ ساله ای است که به علت ضعف و بی حالی و ایکتر مراجعه نموده است. در بررسی:

AST=800

HBSAg+

HBC Ab ( IgM)+

ALT=950

HBS Ab-

HAV Ab (IgM) +

ALP= 470

HCV Ab-

کدام یک از عفونت های زیر برای بیمار مطرح است؟

الف) هپاتیت حاد B

ب) هپاتیت حاد A و هپاتیت حاد B

ج) هپاتیت حاد A و هپاتیت مزمن B

د) هپاتیت مزمن A و هپاتیت مزمن B

۴- آقای ۴۰ ساله ای که با سیروز کبدی ناشی از الکل، دچار خونریزی حاد گوارشی شده است، به اورژانس آورده می شود. در بررسی های به عمل آمده واریس های خونریزی دهنده مری اثبات شده است. در کنترل خونریزی حاد این بیمار تمام اقدامات زیر موثر هستند، به جز:

الف) اکتریوتاید وریدی

ب) سوماتواستاتین وریدی

ج) پروپرانولول وریدی

د) باندلیگاسیون با آندوسکوپ

۵- خانم ۲۹ ساله ای با درد شکم از یک سال قبل به درمانگاه مراجعه کرده است. درد بیمار همراه با اسهال در طول شبانه روز و به صورت متناوب می باشد. درد بیمار با اجابت مزاج بر طرف می شود. علائم سیستمیک دیگری ندارد. با توجه به محتمل ترین تشخیص مطرح برای بیمار، کدام یافته با تشخیص احتمالی مغایرت دارد؟

(الف) فقدان علائم سیستمیک

(ب) وجود درد شکم

(ج) اسهال شبانه

(د) بر طرف شدن درد با اجابت مزاج

۶- مرد ۴۵ ساله ای با سابقه مصرف یک پاکت سیگار روزانه به مدت ۲۰ سال، مراجعه کرده است از سرفه و خلط و تنگی نفس شکایت دارد. در اسپرومتری انجام شده  $\frac{FEV_1}{FVC}: 0.65$  و  $FEV_1: \%65$  Predicted می باشد. بیمار از لحاظ معیار GOLD در کدام دسته قرار می گیرد؟

(الف) Mild

(ب) Moderate

(ج) Severe

(د) Very severe

۷- کدامیک از موارد زیر در مورد سرفه در مصرف داروهای مهارکننده ACE صحیح است؟

(الف) سرفه های خلط دار ایجاد می کند.

(ب) ضایعات پارانشیمال محیطی درگرافی دیده می شود.

(ج) در صورت قطع دارو حداکثر تا یک ماه بعد سرفه بر طرف می شود.

(د) احتمال سرفه با دوزهای بالاتر داروهای مهار کننده آنژیوتانسین افزایش می یابد.

۸- خانم ۳۵ ساله که در حدود ۴ روز قبل عمل جراحی دیسک کمر شده است دچار درد قفسه سینه با کیفیت پلورتیک به صورت ناگهانی شده است. در معاینه  $BP: 130/70$  mmhg ،  $RR: 26/min$  و  $PR: 110/min$  دارد. نکته غیر طبیعی دیگری در معاینه ندارد، سابقه بیماری خاصی را نمی دهد. CXR طبیعی است. برای او کدامیک از اقدامات زیر را انجام می دهید؟

(الف) D.dimer

(ب) Chest CT angiography

(ج) Echocardiography

(د) Invasive Pulmonary Angiography

۹- آقای ۶۵ ساله با سابقه آسم تحت درمان با بتا دوآگونیست کوتاه اثر و مونته لوکاست و کورتیکواستروئید استنشاقی و آنتی کولینرژیک استنشاقی است. او دچار احتباس ادراری شده است. چه اقدامی را برای او انجام می دهید؟

(الف) تجویز پرازوسین

(ب) قطع آنتی کولینرژیک استنشاقی

(ج) چک کردن PSA-Free PSA

(د) اضافه کردن دوز کورتیکواستروئید استنشاقی بیمار