

سوالات آزمون کارشناسی ارشد

# اتاق عمل

(کد 108)

1396-1397

دروس:

اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب

بیماری های داخلی و جراحی

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف

آناتومی

بیهوشی و احیای قلبی ریوی

زبان عمومی

برگزارکننده: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

## اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب

۱- پوست کدام نواحی به پرپ حساس است؟

- الف) زخم‌های ترومایی
- ب) شریان براکیال
- ج) پوست و نسوج دچار سوختگی
- د) ناف

۲- کدامیک از موارد زیر در بیمار کاندید عمل جراحی توصیه می‌گردد؟

- الف) در صورت اندیکاسیون سند فولی، این پروسیجر بایستی قبل از ورود بیمار به اتاق عمل انجام شود.
- ب) پوشیدن جوراب ضد آمبولی فقط در اعمال جراحی ارتوپدی ضرورت دارد.
- ج) در صورت اندیکاسیون بیهوشی عمومی، نیازی به برداشتن لنز تماسی نیست.
- د) نیازی به خارج کردن دندان مصنوعی، حین بیهوشی موضعی نیست.

۳- جهت آماده‌سازی اتاق عمل در بین جراحی‌ها، کدام مورد بایستی رعایت گردد؟

- الف) در بیماران دچار الودگی باکتریایی آندوسپوری شناخته شده، جهت پاکسازی محیط بایستی از ماده با پایه هیپوکلریت استفاده شود.
- ب) در بیماران مبتلا به آنسفالوپاتی اسپانجیفرم قابل انتقال مشکوک یا ناشناخته، بایستی تجهیزات مربوط با هیپوکلریت ضدعفونی شود.
- ج) در بین اعمال جراحی، تمیز نمودن کف اتاق به قطر ۳-۲ فوت در اطراف موضع جراحی کفایت می‌کند.
- د) دیوارهای اتاق عمل بایستی در بین اعمال جراحی کاملاً شستشو شوند.

۴- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص ضدعفونی اتاق عمل و تجهیزات آن صحیح است؟

- الف) چراغ سیالتیک بایستی با محلول ساولن ضدعفونی شود.
- ب) کاف فشار سنج بایستی در پایان اعمال جراحی، به صورت روزانه با ماده ضدعفونی تایید شده تمیز شود.
- ج) هر بیمار را باید یک منبع آلودگی در محیط تصور نمود و پاکسازی را برای کلیه ارگان‌های احتمالی انجام داد.
- د) تجهیزات پرتابل و سقفی بایستی به صورت خشک گردگیری شوند.

۵- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص مراقبت‌های قبل از عمل صحیح می‌باشد؟

- الف) گرافی قفسه سینه و الکتروکاردیوگرام در بیماران ۴۰ سال به بالا جزو تست‌های روتین قبل از عمل است.
- ب) آزمایشات روتین قبل از عمل شامل هموگلوبین، هماتوکریت BUN و قند خون لازم است ۴۸ ساعت پیش از بستری انجام شود.
- ج) تست‌های پیش از بستری تنها به مدت ۱۵ روز قابل قبول هستند.
- د) در صورت صلاحدید جراح یا متخصص بیهوشی در بیماران خاص مایعات شفاف می‌توانند ۲-۳ ساعت قبل از عمل مصرف شود.