

## آنومالی دید دوچشمی

- سوال ۱- کدامیک از آنومالی‌های دید دو چشمی غالباً مربوط به دید دور است؟  
 الف) ناتوانی تقارب (ب) اگزوفوریای اصلی (ج) ایزوفوریای ضعف تباعد (د) ایزوفوریای فزونی تقارب
- سوال ۲- بیماری ۴۸ ساله به کلینیک اپتومتری مراجعه کرده و از دو بینی ناگهانی شکایت دارد. عیوب انکساری چشم راست و چپ به ترتیب  $R: +1.00 - 0.75 \times 180$  و  $L: +0.50 - 0.50 \times 180$  می‌باشد. مقادیر هتروفوریای افقی دور ۵- پریزم دیوپتر و عمودی ۱ پریزم دیوپتر راست هاپیر می‌باشد. اولین مرحله درمان این بیمار کدام است؟  
 الف) اصلاح عیوب انکساری  
 ب) تجویز منشور افقی  
 ج) ارجاع به متخصص مغز و اعصاب  
 د) تجویز منشور عمودی

- سوال ۳- با توجه به اهمیت فیکسیشن دیسپاریتی در دید دو چشمی، وجود کدامیک از موارد زیر نشان دهنده هتروفوریای غیر جبرانی نمی‌باشد؟  
 الف) مقدار زیاد فیکسیشن دیسپاریتی با توجه به دستگاه اندازه‌گیری  
 ب) منشور اصلاحی بیشتر از حد نرمال دستگاه مربوطه  
 ج) ذخیره‌های منشوری معکوس کم  
 د) عادت پذیری به منشور

- سوال ۴- غالباً بیماران اگزوفوریک چه نوع منحنی فیکسیشن دیسپاریتی دارند؟  
 الف) I (ب) II (ج) III (د) IV

- سوال ۵- کدامیک از آنومالی‌های دید دو چشمی غالباً در بیماران دیسلکسی بروز می‌کند؟  
 الف) هتروفوریا  
 ب) ناتوانی دوچشمی (Binocular disability)  
 ج) فیکسیشن دیسپاریتی  
 د) استرابیسم

- سوال ۶- کدامیک از عبارات زیر در مورد عادت پذیری به منشور صحیح‌تر است؟  
 الف) در اغلب بیماران با دید دو چشمی طبیعی وجود دارد  
 ب) یک مکانیزم غیر طبیعی برای موازی نگه داشتن محورهای بنیادی دو چشم است  
 ج) هتروفوریا بر اثر عادت پذیری به منشور به وجود می‌آید  
 د) رابطه مستقیم با فیکسیشن دیسپاریتی دارد

- سوال ۷- کدامیک از عبارات زیر در مورد سندرم Sensory Fusion Disruption صحیح‌تر است؟  
 الف) بر اثر صدمات مغزی اکتسابی ایجاد می‌شود  
 ب) همان Horror Fusionis است  
 ج) پیش‌آگهی درمانش معمولاً متوسط است  
 د) اساساً درمان با عدسی، منشور و تمرینات بینایی موفقیت‌آمیز است