

صبح  
پنجشنبه

۹۶/۴/۲۲

## برنام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی  
دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

### سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

سنجش  
و  
آنالیز

روشه

## بینائی سنجی

تعداد سوالات: ۱۶۰

زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۰

مشخصات داوطلب:

نام و نام خانوادگی: .....

شماره کارت: .....

داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

### آنومالی دید دو چشمی

- ۱ - مناسب‌ترین زمان برای چکاندن قطره سیکلو پلزیک برای انجام رفرکشن در بیماری که دچار اسپاسم تطابق می‌باشد کدام است؟**
- (الف) ۱۱ - ۸ صبح      (ب) ۱۰ - ۸ شب      (ج) ۸ - ۶ صبح
- ۲ - مهم‌ترین عامل تشخیص هتروفوریای غیر جبرانی کدام است؟**
- (الف) وجود علائم مطالعه در نور کم      (ب) انجام کار چشمی در فاصله بسیار نزدیک      (ج) وجود فیکشین دیسپاریتی
- ۳ - بیماری ۱۰ ساله به کلینیک اپتومتری مراجعه کرده و شکایت از حرکت کلمات در صفحه کتاب، دنبال کردن خطوط کتاب و احساس کشش چشم، حساسیت به نور دارد، اما سر درد ندارد. معاینات اپتومتری نشان دهنده تیزبینی، عیوب انکساری و تطابق نرمال می‌باشد. درمان مناسب برای این بیمار کدام است؟**
- (الف) تجویز منشور      (ب) تجویز عدسی محدب      (ج) تمرین ذخیره منشوری تقاربی      (د) ارجاع به متخصص چشم پزشک یا دیگر متخصصین
- ۴ - کدام یک از عبارات زیر در خصوص فیکشین دیسپاریتی صحیح‌تر است؟**
- (الف) وجود انحراف کم چشم‌ها همراه با دو بینی      (ب) انحراف جزئی چشم‌ها همراه مختصر ساپرسشن      (ج) هماهنگی یک نقطه از رتین یک چشم با بک منطقه از رتین چشم دیگر با وجود انحراف جزئی چشم‌ها و قرار گرفتن تصویر در خارج از منطقه پانوم یک چشم بدون دو بینی      (د) انحراف جزئی چشم‌ها با وجود تصویر در منطقه پانوم چشم‌ها
- ۵ - غالباً همراه با کدام بیماری است؟ binocular Instability**
- (الف) استرایسم      (ب) نیستاگموس      (ج) دیسلکسیا      (د) سیکلوفوریا
- ۶ - غالباً عادت پذیری به منشور در کدام یک از موارد زیر رخ می‌دهد؟**
- (الف) هترو فوریای غیر جبرانی      (ب) استرایسم غیر کامپیتانت      (ج) اختلالات تطابقی و تقاربی      (د) اغلب بیماران با دید دو چشمی نرمال
- ۷ - در کدام نوع هتروفوریا شیوع بیشتری دارد؟ Incipient presbyopia**
- (الف) فزونی تقارب      (ب) ضعف تقارب      (ج) ایزو فوریای مخلوط (Convergence insufficiency)      (د) ناتوانی تقارب