

آسیب شناسی روانی

۱- کدام یک از نشانه‌های زیر جزء نشانه‌های مثبت اسکیزوفرنی نیست؟

- (الف) ضعف تعامل‌های اجتماعی
(ب) هذیان و توهم
(ج) هیجان‌نا مناسب
(د) اختلال فکر

۲- پُرخوری عصبی (bulimia nervosa) با چه اختلال دیگری قابل مقایسه می‌باشد؟

- (الف) بی‌اشتهایی عصبی
(ب) بیماری عدم تحمل لاکتوز
(ج) سیستم بازخورد انسولین و گلوکاگون
(د) اعتیاد

۳- آقای ۴۳ ساله‌ای با مراجعه به درمانگاه یک مرکز درمانی از ناتوانی در بیاد آوردن اطلاعات مهم شخصی و اضطرابی که ماهیت آسیب‌زا و تنش‌زا دارد شکایت دارد بر طبق DSM-IV-IR محتمل‌ترین اختلال چیست؟

- (الف) فراموشی مرتبط با مواد
(ب) دمانس
(ج) فراموشی تجزیه‌ای
(د) فراموشی متعاقب سانحه

۴- حداقل مدت زمان برای تشخیص اختلال‌های خلقی چقدر است؟

- (الف) MDD - ۲ هفته، Bipolar-I - ۴ روز، Bipolar - II - یک هفته، Dysthymic - ۲ سال، Cyclothymic - ۲ سال
(ب) MDD - ۲ هفته، Bipolar-I - یک هفته، Bipolar - II - ۴ روز، Dysthymic - یک سال، Cyclothymic - ۲ سال
(ج) MDD - ۲ هفته، Bipolar-I - یک هفته، Bipolar - II - ۴ روز، Dysthymic - ۲ سال، Cyclothymic - ۲ سال
(د) MDD - ۲ هفته، Bipolar-I - یک هفته، Bipolar - II - ۴ روز، Dysthymic - ۲ سال، Cyclothymic - یک سال

۵- کدام یک از علائم زیر جزو ملاک‌های تشخیصی MDD از نوع Melancholic است؟

- (الف) Increase in appetite
(ب) Depression worsening in morning
(ج) Echopraxia
(د) Hypersomnia

۶- بیماری که مبتلا به delusional disorder است در هذیانهای خود می‌گوید: «شخصی با موقعیت بسیار بالا

از راه دور به وی عشق می‌ورزد» او مبتلا به کدام یک از انواع این اختلال است؟

- (الف) Jealous
(ب) Grandiose
(ج) Erotomantic
(د) Persecutory