

تشریح عمومی

- ۱- شروع ورید آزیگوس از الحاق کدام وریدهای زیر می باشد؟
- الف) وریدهای بین دنده‌ای خلفی چپ
 ب) ورید کمری چپ و ورید ساب کوستال چپ
 ج) ورید کمری صعودی راست و ورید ساب کوستال راست
 د) یازدهمین ورید بین دنده‌ای راست و ورید ساب کوستال راست
- ۲- نیام کدام عضله در تشکیل غلاف رکتوس شرکت نمی کند؟
- الف) عضله مستقیم شکمی
 ب) عضله مایل خارجی
 ج) عضله مایل داخلی
 د) عضله عرضی شکم
- ۳- قسمت تحتانی سوراخ وینسلو با کدام ساختمان زیر مجاورت دارد؟
- الف) لوب کودیت کبد
 ب) قسمت اول دئودنوم
 ج) ورید اجوف تحتانی
 د) مجرای صفراوی مشترک
- ۴- لایه‌های بیضه (testis) از سطح به عمق عبارتند از:
- الف) تونیکا واژینالیس - تونیکا آلبوژینه آ - تونیکا و اسکولزا
 ب) تونیکا آلبوژینه آ - تونیکا واژینالیس - تونیکا و اسکولزا
 ج) تونیکا آلبوژینه آ - تونیکا و اسکولزا - تونیکا واژینالیس
 د) تونیکا و اسکولزا - تونیکا آلبوژینه آ - تونیکا واژینالیس
- ۵- کدام ورید در ارتباط با بن بست پارادئوئال (para duodenal-recess) است؟
- الف) ورید مزانتریک تحتانی
 ب) ورید مزانتریک فوقانی
 ج) ورید کلیوی چپ
 د) ورید گونادی چپ
- ۶- کدام گزبنه زیر از ویژگی‌های Moderate septo marginal band است؟
- الف) در بطن چپ قرار دارد.
 ب) بخشی از سیستم هدایتی قلب به‌شمار می‌رود.
 ج) پلی میان قاعده عضله پاپیلاری خلفی و قسمت تحتانی سپتوم بین بطنی است.
 د) ناپایدار است و ممکن است کوچک و یا غایب باشد.
- ۷- کدام شریان از تنه خلفی شریان ایلیاک داخلی منشأ نمی‌گیرد؟
- الف) ایلئولومبار
 ب) ساکرال طرفی
 ج) گلوتئال داخلی
 د) واژینال