

آزمون کارشناسی ارشد سال (۸۸-۸۷)

داخلی جراحی

۱- بیماری برای جراحی قلب باز تحت بیهوشی طولانی مدت قرار گرفته است، این بیمار بعد از عمل دچار اختلال در ریتم خواب و بیداری شده است . این اختلال که ممکن است ۴-۶ هفته ادامه یابد، در اثر کدام عامل بوجود آمده است؟

الف) اضطراب (ب) تاثیر داروی بیهوشی

ج) تغییر در ریتم شبانه روزی (د) درد ناحیه عمل جراحی

۲- در بررسی وضعیت مددجو پرستار می بایستی علائم حیاتی : فشار خون ، نبض ، تنفس و درجه حرارت را با دقت بررسی کند، علامت «پنجم حیاتی» که مورد توجه منابع علمی می باشد کدام است؟

الف) اضطراب (ب) درد (ج) رنگ پوست (د) اندازه مردمک

۳- بیماری به علت انسداد مزمن ریوی در بخش بستری و دچار اختلال تنفسی است. الگوی مناسب تنفسی برای این بیمار کدام است؟

الف) تنفس لب غنچه ای (ب) تنفس عمیق و منظم (ج) تنفس شکمی (د) تنفس کوتاه و کند

۴- بیماری به علت مشکل تنفسی، دستور استراحت مطلق دارد . کدام یک از تشخیص های پرستاری بالقوه زیر محتمل و صحیح است ؟

الف) احتمال بروز سکنه مغزی به علت هیپوکسی بافتی

ب) احتمال بروز قطع تنفس به علت اسیدوز متابولیک

ج) احتمال بروز پنومونی هیپوستاتیک به علت آسپیراسیون ریوی

د) احتمال بروز اختلال تنفسی به علت آمبولی ریوی

۵- در مراقبت پرستاری از بیمار مبتلا به توبرکلوزیس جهت سهولت تخلیه ترشحات ریه توصیه شما کدام است؟

الف) قرار دادن بیمار در وضعیت درناژ (ب) آموزش انجام تنفس های تند و عمیق

ج) مصرف مایعات فراوان (د) عدم مصرف غذاهای محرک

۶- بیماری از درد قفسه سینه شاکی است و دستور استفاده از قرص نیتروگلسیرین زیر زبانی دارد . احتمال بروز کدام عارضه جانبی وجود دارد؟

الف) کاهش فشار خون (ب) افزایش فشار خون

ج) خونریزی بینی (د) برادیکاردی

۷- تشخیص های پرستاری بالقوه برای بیمار مبتلا به انفارکتوس کدام است؟

الف) ادم حاد ریه به علت بی کفایتی بطن چپ

ب) اختلال در الگوی تنفس به علت بی کفایتی پمپاژ قلب

ج) انفارکتوس قلبی به علت انسداد عروق کرونر

د) اختلال در خونرسانی مغز به علت آمبولی

۸- در کدام یک از انواع آنژین های صدری زیر توصیه پرستار به استراحت، اصولاً منجر به تسکین درد

قفسه سینه می گردد؟

الف) آنژین متغیر (unstable angina)

ب) آنژین ثابت (stable angina)