

عصر پنجشنبه

۹۶/۴/۲۲

## سال تحصیلی ۹۶-۹۷

### سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته:

## مجموعه پرستاری

دروس امتحانی و ضرایب امتحانی						رشته امتحانی
زبان عمومی	روان پرستاری	بهداشت جامعه	بهداشت مادران و نوزادان	کودکان	داخلی-جراحی	
۲	۴	۲	۲	۲	۲	روان پرستاری
۲	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری داخلی-جراحی
۲	۲	۴	۲	۲	۲	پرستاری سلامت جامعه
۲	۲	۲	۲	۴	۲	پرستاری کودکان
۲	۴	۲	۲	۲	۳	پرستاری نظامی
۲	۱	۲	۳	۳	۳	پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان
۲	۴	۲	۲	۲	۳	پرستاری توانبخشی
۲	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری اورژانس
۲	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری مراقبت‌های ویژه
۲	۴	۳	۱	۱	۴	پرستاری سالمندی
۲	۲	۴	۲	۲	۲	مدیریت پرستاری

iranpuyesh.ir

مجموعه پرستاری

## داخلی و جراحی

- ۱- در کدامیک از موقعیت های زیر شستشوی دست به ضد عفونی کردن آن با الکل ترجیح دارد؟  
 الف) آلودگی واضح دست ها با مواد بیولوژیک بیمار  
 ب) تماس با بدن آلوده یک بیمار و سپس بدن تمیز بیمار بعدی  
 ج) مراقبت از بیمار مبتلا به نوتروپنی شدید یا سرکوب شدید ایمنی  
 د) قبل از پوشیدن دستکش برای قرار دادن کاتترهای مرکزی
- ۲- به دنبال انفارکتوس قلبی کدامیک از آنزیم های زیر افزایش می یابد؟  
 الف) CK-MM      ب) CK-BB      ج) CK-MB      د) LDH
- ۳- بروز درد قفسه سینه (Chest Pain) متأثر از التهاب پریکارد (Pericarditis) به کدام اشکال زیر اظهار می شود؟  
 الف) متناوب توام با دم و بازدم  
 ب) درد طولانی مدت و شدید  
 ج) انتشار درد صرفاً به ناحیه فک و بناگوش  
 د) تسکین درد با استفاده از قرص نیتروگلیسرین زیر زبانی
- ۴- امتیاز کما (Glasgow Coma Scale) در بیماری که با تحریکات دردناک چشمش را باز می کند، پاسخ کلامی ندارد و از نظر حرکتی اکستانسیون غیرطبیعی دارد، چگونه گزارش می شود؟  
 الف) پنج      ب) هفت      ج) شش      د) سه
- ۵- در خصوص پونکسیون کمری (Lumbar Puncture) و فشار مایع مغزی نخاعی کدام عبارت زیر صحیح است؟  
 الف) آماده سازی نواحی پشت بیمار و فشار طبیعی کمتر از ۷۵ میلیمتر آب  
 ب) آماده سازی پوزیشن دهر (Prone) و فشار طبیعی ۷۰ تا ۱۲۰ میلیمتر آب  
 ج) آماده سازی ناحیه L4-L5 و فشار طبیعی ۷۵ تا ۱۸۰ میلیمتر آب  
 د) آماده سازی ناحیه S1-S5 و فشار طبیعی بیش از ۲۰۰ میلیمتر آب
- ۶- کدامیک از موارد زیر برای توصیف تنفس کوسمال (Kussmauls Respiration) به منظور ارائه گزارش شفاهی و کتبی، مناسب است؟  
 الف) تنفس منظم عمیق توام با افزایش جدی تعداد تنفس  
 ب) تنفس ریتمیک عمیق توام با کاهش تعداد تنفس  
 ج) تنفس نامنظم با دامنه کوتاه  
 د) تنفس منظم توام با قطع موقت تنفس
- ۷- از نظر مراقبتی به دنبال جراحی کامل حنجره (Total Laryngectomy) کدام وضعیت زیر مناسب تر است؟  
 الف) قرار گرفتن وضعیت سر و گردن در موقعیت کاملاً صاف و طاق باز  
 ب) قرار گرفتن سر و گردن براساس ترجیح بیمار  
 ج) قرار دادن سر و گردن در وضعیت صاف به پهلو چپ  
 د) بالا قرار دادن وضعیت سر و گردن در زاویه ۳۰-۴۵ درجه