

## داخلی - جراحی

- ۱- در مراقبت از بیمار دچار خشکی دهان متعاقب رادیوتراپی خارجی کدام مورد صحیح می باشد؟  
 الف) دهانشویه با محلول پراکسید هیدروژن ده درصد  
 ب) مزه مزه کردن مرتب آب در دهان  
 ج) دهانشویه قبل و بعد از مصرف غذا  
 د) دهانشویه با محلول دیفن هیدرامین
- ۲- سطح سرمی کدام یک از آنزیم های زیر بطور اختصاصی در انفارکتوس میوکارد افزایش می یابد؟  
 الف) کراتین کیناز (ب) تروپونین (ج) میوگلوبین (د) ال دی اچ
- ۳- کدام یک از تغییرات بافتی زیر در عضله قلب که ناشی از اختلال خورسانی است، معمولاً برگشت پذیر می باشد؟  
 الف) ایسکمی (ب) آسیب (ج) نکروز (د) انفارکتوس
- ۴- تفسیر شما به عنوان یک پرستار هنگام پذیرش بیمار در بیمارستان با دیس پنه شدید و ویزینگ با سطح گازهای خون شریانی  $\text{HCO}_3=24$ ,  $\text{Pao}_2=65 \text{ mmHg}$ ,  $\text{Paco}_2=55 \text{ mmHg}$ ,  $\text{PH}=7.24$  از نتایج آزمایش چیست؟  
 الف) اسیدوز متابولیک (ب) آلکالوز متابولیک (ج) اسیدوز تنفسی (د) آلکالوز تنفسی
- ۵- برای پیشگیری از آسپیراسیون در بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری، پرستار کدام یک از اقدامات زیر را در برنامه مراقبتی مورد توجه قرار می دهد؟  
 الف) بالا نگه داشتن سر تخت به میزان ۳۰ درجه  
 ب) فیزیوتراپی قفسه سینه  
 ج) سمع ریه ها هر ۱۲ ساعت یک بار  
 د) استفاده از پوزیشن ترندلنبرگ
- ۶- در بیماران تحت عمل جراحی کرانیوتومی که تحت درمان گسترده با کورتیکواستروئیدها قرار می گیرد، پرستار کدام یک از اختلالات زیر را بررسی و در برنامه مراقبتی خود مورد توجه قرار می دهد؟  
 الف) هایپوناترمی (ب) هایپرکلسمی (ج) هایپرگلیسمی (د) هایپومنیزیمی
- ۷- در بررسی بیمار کمایی، پرستار کدام یک از مکانیسم های بررسی و ارزیابی در بیمار را در اولویت قرار می دهد؟  
 الف) اعصاب جمجمه ای، سطح هوشیاری  
 ب) سیستم حرکتی، اعصاب جمجمه ای  
 ج) رفلکس ها، اعصاب جمجمه ای  
 د) سطح هوشیاری، رفلکس ها
- ۸- به عنوان یک پرستار دستورالعمل تغذیه ای بیماران تحت عمل جراحی یورتروسیگموئیدوستومی (Uretero Sigmoidostomy) کدام موارد زیر را مدنظر قرار می دهید؟  
 الف) تشویق به جویدن آدامس  
 ب) دریافت نمک به میزان لازم  
 ج) افزایش دریافت پتاسیم  
 د) مواد تغذیه ای گازدار
- ۹- در بیمارانی که تحت پیوند کلیه قرار گرفته اند و داروی سیکلوسپورین مصرف می کنند، پرستار کدام یک از علائم زیر را به عنوان علامت پس زدن حاد پیوند کلیه گزارش می نماید؟  
 الف) افزایش فشارخون  
 ب) الیگوری  
 ج) افزایش وزن  
 د) افزایش بدون نشانه کراتینین سرم