

سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری (کد ۱۶۸)

عصر پنج شنبه | ۱۴۰۲/۳/۴

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه						رشته امتحانی
زبان عمومی	روان پرستاری	بهداشت جامعه	بهداشت مادران و نوزدان	کودکان	داخلی - جراحی	
۴	۴	۲	۲	۲	۲	روان پرستاری
۴	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری داخلی - جراحی
۴	۲	۴	۲	۲	۲	پرستاری سلامت جامعه
۴	۲	۲	۲	۴	۲	پرستاری کودکان
۴	۴	۲	۲	۲	۳	پرستاری نظامی
۴	۱	۲	۳	۳	۳	پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
۴	۴	۲	۲	۲	۳	پرستاری توانبخشی
۴	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری اورژانس
۴	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری مراقبت های ویژه
۳	۳	۳	۱	۱	۴	پرستاری سالمندی
۳	۳	۳	۱	۲	۳	مدیریت پرستاری

برگزارکننده: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ارائه: سامانه علمی پژوهشی ایران پویش | iranpuyesh.ir

داخلی - جراحی

- ۱- راهبرد استفاده از نوارهای صوتی یا کتاب‌های گویا برای آموزش مددجویان مبتلا به کدام مورد، مناسب‌تر است؟
 الف) ناتوانی جسمی (ب) ناتوانی شناختی (ج) نقص بینایی (د) نقص شنوایی
- ۲- زمانی که فرد قادر نیست وضعیت اخلاقی را به صورت دقیق تعریف نماید، اما احساس قوی دارد که چیزی درست نمی‌باشد، چه نامیده می‌شود؟
 الف) دوراهی‌های اخلاقی (Moral dilemmas)
 ب) عدم اطمینان اخلاقی (Moral uncertainty)
 ج) مشکلات اخلاقی (Moral problems)
 د) پریشانی اخلاقی (Moral distress)
- ۳- بیمار مبتلا به سکته مغزی، با کاهش سطح هوشیاری در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. پرستار در ارزیابی پوست، متوجه از دست رفتن ضخامت جزئی درم و وجود زخم کم عمق به رنگ قرمز - صورتی می‌شود. درجه (Grade) زخم فشاری کدام است؟
 الف) یک (ب) دو (ج) سه (د) چهار
- ۴- به دنبال اعمال جراحی و تحت تاثیر داروهای بیهوشی، وقوع کدام مورد محتمل‌تر است؟
 الف) اختلال در دفع ادرار
 ب) اختلال در کنترل ادرار
 ج) بی اختیاری رفلکسی ادرار
 د) بی اختیاری عملکردی ادرار
- ۵- در بیماران سالمند، کاهش میزان پروتئین‌های پلاسما و کل آب بدن با تأثیر بر کدام مکانیسم، سبب تغییر در پاسخ آنها به دارو می‌شود؟
 الف) جذب (ب) دفع (ج) توزیع (د) متابولیسم
- ۶- پرستار در هنگام مانیتورینگ قلبی بیمار، متوجه پهن شدن کمپلکس QRS و محو شدن موج P می‌شود. این یافته‌ها علائم احتمالی کدام اختلال هستند؟
 الف) هیپرناترمی خفیف (ب) هیپرناترمی شدید (ج) هیپرکالمی خفیف (د) هیپرکالمی شدید
- ۷- در یک بیمار ۴۰ ساله، در صورت کاهش حجم ادرار به کمتر از ۲۰ میلی‌لیتر در ساعت به مدت ۲ ساعت متوالی، پرستار باید انفوزیون کدام الکترولیت را متوقف کرده و به پزشک اطلاع دهد؟
 الف) سدیم (ب) پتاسیم (ج) کلسیم (د) منیزیم
- ۸- بیمار ۳۰ ساله‌ای دچار کاهش حجم خون شده است. پرستار انتظار دارد برای جایگزینی هر یک لیتر خون از دست رفته، چند لیتر مایع ایزوتونیک، تجویز شود؟
 الف) یک (ب) دو (ج) سه (د) چهار
- ۹- در فرآیند پرستاری، جهت جلب توجه بیماران نسبت به حل مسئله، "ارائه ایده‌های جایگزین"، کدام تکنیک محسوب می‌شود؟
 الف) پیشنهاد کردن (Suggesting)
 ب) شفاف سازی (Clarification)
 ج) انعکاس دادن (Reflection)
 د) اطلاع رسانی (Informing)