

عصر

پنجشنبه

۹۰/۴/۲

الا بذكرنا... تطمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سؤالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته:

مامایی (دفترچه الف)

سال تحصیلی ۹۰-۹۱

تعداد سؤالات: ۱۶۰

زمان: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۱

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سؤالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

مامایی (الف)

بارداری و زایمان و بیماری های زنان

سوال ۱- خانمی ۴۲ ساله با حاملگی ۲۰ هفته برای مراقبت های بارداری مراجعه کرده است. انجام کلیه اقدامات زیر توصیه می شود، بجز:

- الف) بررسی آلفا فیتوپروتئین سرم مادر
 ب) بررسی سونوگرافیک به منظور تشخیص آنومالی ها
 ج) انجام آمینوسنتز به دنبال آلفا فیتوپروتئین سرم مادر
 د) انجام کاربوتایپ به دنبال آلفافیتو پروتئین بالای مادر و طبیعی جنین

سوال ۲- کدامیک از ارزیابی های آزمایشگاهی زیر برای تشخیص خطر بروز ناهنجاری های مادرزادی در زنان مبتلا به دیابت بارداری استفاده می شود؟

- الف) گلوکز ناشتا
 ب) هموگلوبین A1C
 ج) کراتینین سرم
 د) پروتئین ادرار

سوال ۳- مصرف بیش از حد انواع ماهی احتمال بروز کدامیک از عوارض زیر را در جنین افزایش می دهد؟

- الف) عوارض قلبی
 ب) عوارض عصبی
 ج) محدودیت رشد داخل رحم
 د) زایمان پره ترم

سوال ۴- در ارتباط با واکسیناسیون هپاتیت A و B کدام عبارت صحیح است؟

- الف) پروفیلاکسی آن فقط پس از مواجهه تجویز می شود
 ب) در تمام موارد پیش و پس از مواجهه تجویز می شوند
 ج) در زنان در معرض خطر عفونت، پیش و پس از مواجهه تجویز می شوند
 د) تجویز آن در سراسر طول حاملگی ممنوع است.

سوال ۵- کدام گزینه در مورد معیار تشخیصی الگوی لیبر غیرطبیعی زنان نولی پار در اختلال طول کشیدن نزول سر جنین صحیح است؟

- الف) کمتر از ۱ سانتی متر در ساعت
 ب) کمتر از ۱/۵ سانتی متر در ساعت
 ج) کمتر از ۱/۲ سانتی متر در ساعت
 د) کمتر از ۲ سانتی متر در ساعت

سوال ۶- در مورد هیدرآمیونیوس علامت دار کدامیک از موارد زیر توصیه می شود؟

- الف) استراحت در بستر
 ب) دیورتیک ها
 ج) محدودیت مصرف نمک
 د) استفاده از ایندومتاسین

سوال ۷- در کدامیک از موارد زیر خطر مرده زایی در حاملگی بعدی کمتر است؟

- الف) سابقه تولد نوزاد ترم زنده دچار محدودیت رشد
 ب) سابقه تولد نوزاد زنده پره ترم دچار محدودیت رشد
 ج) خانم کم خطر دارای سابقه مرده زایی بدون توجیه
 د) سابقه مرده زایی به علت نارسایی جفت