

برنام آنکه جان را کثرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

مجموعه مامایی (الف)

(مامایی، مشاوره در مامایی)

ضرایب دروس							رشته امتحانی
زبان عمومی	روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی	بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی	جنین شناسی	نوزادان و مراقبتهای مربوطه	بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده	بارداری و زایمان و بیماریهای زنان	
۲	۰	۱	۱	۲	۲	۴	مامایی
۲	۲	۰	۰	۲	۴	۲	مشاوره در مامایی

تعداد سئوالات :	۱۶۰
زمان پاسخگویی:	۱۶۰ دقیقه
تعداد صفحات :	۲۰

داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

مجموعه مامایی (الف)

عصر
پنجشنبه
۹۴/۲/۳۱

بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان

- ۱- فرایند بلوغ سرویکس جهت آمادگی برای زایمان چگونه است؟
 الف) کاهش بکسواختی فیبریل و افزایش فیبرهای کلاژن
 ب) سامان‌دهی فیبریل و کلاژن
 ج) افزایش بکسواختی فیبریل و کاهش فیبرهای کلاژن
 د) افزایش بکسواختی فیبریل و افزایش فیبرهای کلاژن
- ۲- شایع‌ترین آسیب عضله در زایمان وازینال کدام یک از موارد زیر است؟
 الف) پوبوآنالیس ب) پوبوبرینتالیس ج) پوبوویرال د) ایلئوکوکسیژیوس
- ۳- عروق لنفاوی سرویکس عمدتاً در چه گره‌های لنفاوی تخلیه می‌شود؟
 الف) ایلیاک خارجی ب) پری آنورت ج) ایلیاک داخلی د) تخمدان
- ۴- حداقل فضای استاندارد برای اتاق LDR (زایمان، وضع حمل، ریکاوری) چقدر است؟
 الف) ۲۲/۵ متر مربع ب) ۲۳/۸ متر مربع ج) ۴۰ متر مربع د) ۲۳/۸ متر مربع
- ۵- عدم نزول سر جنین بیش از چه مدتی نشانه اختلال توقفی زایمان در زنان نولی پار است؟
 الف) ۱ ساعت ب) ۲ ساعت ج) ۳ ساعت د) ۴ ساعت
- ۶- کدام یک از موارد زیر ممنوعیت مطلق ورزش هوازی در بارداری محسوب می‌شود؟
 الف) بیماری قلبی کلاس یک
 ب) آنمی شدید درمان نشده
 ج) تشخیص جفت سر راهی پس از هفته ۲۶ بارداری
 د) مصرف شدید سیگار به مدت حداقل ۵ سال
- ۷- در زایمان باواکیوم، کدام یک از موارد زیر نسبت به زایمان فورسپس بیشتر است؟
 الف) خونریزی مادر ب) زردی‌های نوزادی ج) ایبی زیاتومی د) پارگی درجه ۳ و ۴
- ۸- کدام یک از موارد زیر در مورد درمان مول صحیح است؟
 الف) تخلیه مکشی درمان انتخابی است
 ب) پس از تخلیه بافت، تجویز اکسی توسین کنتراندیکه است
 ج) زمانی که میزان بتا hCG به مقادیر طبیعی کاهش یافت، بیمار باید هر ۶ ماه ارزیابی شود
 د) شیمی درمانی پروفیلاکتیک، پیش آگهی درازمدت را بهبود می‌دهد
- ۹- کدام یک از موارد زیر در خصوص ویژگی‌های بالینی خونریزی‌های زایمان صحیح است؟
 الف) عوارض ناشی از خونریزی به حجم خون مادر قبل از بارداری بستگی ندارد.
 ب) خونریزی بلافاصله موجب تغییر تعداد ضربان قلب و فشار خون مادر می‌شود.
 ج) در مادران مبتلا به پره اکلامپسی افزایش حجم خون بیشتر است.
 د) رحم منقبض همراه با خون قرمز روشن دال بر خونریزی شریانی حاصل از پارگی است.
- ۱۰- بعد از دکولمان جفت کدام یک از موارد زیر فقط با لاپاراتومی تشخیص قطعی داده می‌شود؟
 الف) کوآگولوپاتی مصرفی ب) نارسایی کلیه ج) رحم کوولر د) سندرم شیهان