

صبح جمعه

۹۶/۴/۲۳

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته:

مجموعه مامایی

| دروس امتحانی و ضرایب امتحانی | | | | | | | رشته امتحانی |
|------------------------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| زبان انگلیسی | روانشناسی در مامایی و اختلالات جنسی | بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی | جنین شناسی | نوزادان و مراقبتهای مربوطه | بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده | بارداری و زایمانو بیماریهای زنان | |
| ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | مامایی |
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴ | مشاوره در مامایی |

مجموعه مامایی

به نام خدا

بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان

۱- کدام گزینه در مورد نمودار وضع حمل (پارتوگرام) سازمان جهانی بهداشت صحیح است؟

- الف) پارتوگراف در زنان نولی پارومولتی بار مشابه است.
 ب) مرحله فعال در دیلاتاسیون ۵ سانتی متری شروع می‌شود.
 ج) در روند آنالیز از خطوط هشدار و انتظار استفاده می‌شود.
 د) در مواردی که مرحله فعال آهسته است، ۳ ساعت انتظار قبل از مداخله توصیه می‌شود.

۲- فقدان لانه‌گزی بنی عمقی جفت با کدامیک از عوامل زیر می‌تواند همراه باشد؟

- الف) محدودیت رشد جنین
 ب) دوقلوئی
 ج) دیابت بارداری
 د) ناهنجاری جنینی
- ۳- کدام گزینه زیر در مورد عوارض مادری دیستوشی صحیح است؟

- الف) احتمال پارگی در سگمان فوقانی رحم وجود دارد.
 ب) شیوع فیستول‌ها در همه جوامع مشابه است.
 ج) آسیب‌های کف لگن سبب بی‌اختیاری و پرولاپس اعضای لگنی می‌شود.
 د) شایع‌ترین مکانیسم آسیب اعصاب اندام تحتانی، فشردگی عصب رکتال است.

۴- کدام گزینه از ویژگی‌های مصرف میپریدین عضلانی برای تسکین درد لیبر است؟

- الف) ۱۰۰-۵۰ میلی گرم هر ۲-۴ ساعت
 ب) ۱۰۰ میلی گرم تک دوز
 ج) ۵۰ میلی گرم هر ساعت
 د) ۲۵-۵۰ میلی گرم تک دوز

۵- کدام عبارت در مورد تکنیک‌های مکانیکی القای لیبر صحیح است؟

- الف) آنافیلاکسی پس از گذاشتن لامیناریا شایع است.
 ب) فقط در موارد نامطلوب بودن سرویکس به کار می‌روند.
 ج) در مقایسه با پروستاگلاندین‌ها خطر بروز تاکی سیستول رحمی را افزایش می‌دهد.