

برنام آنگدجان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۹-۹۸

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه مامایی

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه							رشته امتحانی
زبان عمومی	روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی	بیماری‌های داخلی و جراحی مربوط به مامایی	جنین شناسی	نوزادان و مراقبت‌های مربوطه	بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده	بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان	
۲	۰	۱	۱	۲	۲	۴	مامایی
۲	۲	۰	۰	۲	۳	۳	مشاوره در مامایی

مشخصات داوطلب: تعداد سوالات: ۱۶۰ سوال

نام و نام خانوادگی: زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

شماره کارت: تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

داوطلب عزیز

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان**۱ - کدامیک از موارد زیر در مورد لیبر صحیح است؟**

- الف) در تعریف جدید ACOG لیبر فعال در دیلاتاسیون ۶ سانتی‌متری آغاز می‌شود.
 ب) مرحله نهفته طول کشیده در زنان نولی پار در حدود ۱۴ ساعت است.
 ج) چاقی مادر، مراحل اولیه لیبر را ۱ تا ۲ ساعت طولانی‌تر می‌کند.
 د) ترس مادر ۱۵ تا ۴۵ دقیقه طول لیبر را کاهش می‌دهد.

۲ - کدامیک از جملات زیر در خصوص مراقبت‌های دندانپزشکی در بارداری صحیح است؟

- الف) درمان بیماری پریدونتال در بارداری از بروز زایمان پره ترم جلوگیری می‌کند.
 ب) بارداری کنتراندیکاسیون درمان‌های دندانپزشکی است.
 ج) حاملگی سبب تشدید پوسیدگی دندان می‌شود.
 د) رادیوگرافی دندان در بارداری کنتراندیکه نیست.

۳ - خانمی دچار گسیختگی اپیزیاتومی شده است. همه موارد در پروتکل قبل از عمل برای ترمیم صحیح است، بجز:

- الف) دبریدمان بافت نکروتیک
 ب) شستشوی زخم با بتادین
 ج) بستن زخم به محض بروز تب
 د) آنالژزی یا بی‌حسی کافی

۴ - خانمی در شروع لیبر فعال دارای جنینی با قرار عرضی است، کدامیک از تدابیر درمانی زیر صحیح است؟

- الف) معمولاً اندیکاسیونی برای زایمان سزارین است.
 ب) در صورت پاره شدن پرده‌ها، چرخش خارجی انجام می‌شود.
 ج) برای انجام سزارین انسزیون عرضی تحتانی ارجح است.
 د) با اعمال فشار بر فوندوس، سر جنین به سمت پایین هدایت می‌شود.

۵ - بر اساس ACOG، آمنیوافوزیون در کدامیک از موارد زیر توصیه نمی‌شود؟

- الف) درمان افت‌های متغیر
 ب) پارگی طولانی مدت پرده‌ها
 ج) ابتلا به الیگو هیدرآمیوس
 د) رقیق کردن مایع آمنیون آغشته به مکنونیوم

۶ - برای خارج‌سازی بریج ناکامل، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

- الف) اپیزیاتومی لترال ارجح است.
 ب) پس از خروج اندام تحتانی، عامل زایمان لگن جنین را با دو دست می‌گیرد و کشش رو به پایین می‌دهد.
 ج) برای خارج کردن بازوی گردنی راست، بدن جنین در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده می‌شود.
 د) با مانور زاوانلی پشت جنین به سمت سمفیز پوبیس چرخانده می‌شود.

۷ - در جریان حاملگی، مسئول هیپرلیپیدمی مادر کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

- الف) افزایش مقاومت به انسولین
 ب) تحریک پروژسترونی
 ج) کاهش فعالیت لیپولیتیک
 د) افزایش فعالیت لیپاز

۸ - با مصرف روزانه چند میکروگرم اسید فولیک قبل از حاملگی می‌توان نقایص لوله عصبی را کاهش داد؟

- الف) ۲۰۰ (ب) ۴۰۰ (ج) ۶۰۰ (د) ۸۰۰