

نوبت سوم

کد ۱۸۵

مجموعه مامایی

برنام آنکد جان را نکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه مامایی

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه							رشته امتحانی
زبان عمومی	روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی	بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی	جنین شناسی	نوزادان و مراقبتهای مربوطه	بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده	بارداری و زایمان و بیماریهای زنان	
۲	۰	۱	۱	۲	۲	۴	مامایی
۲	۲	۰	۰	۲	۴	۳	مشاوره در مامایی

iranpuyesh.ir

مشخصات داوطلب:	تعداد سوالات: ۱۶۰
نام و نام خانوادگی:	زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه
شماره کارت:	تعداد صفحات: ۲۲

داوطلب عزیز
خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان

- ۱- در سه ماهه اول بارداری چه میزانی از سطح TSH می‌تواند دلالت بر هیپوتیروئیدی داشته باشد؟
الف) ۰/۲ (ب) ۰/۵ (ج) ۰/۶ (د) ۰/۷
- ۲- خانمی ۲۰ ساله G₁، حامله ۳۵ هفته با فشار خون ۱۴۰/۹۰ به شما مراجعه می‌کند. هیچگونه سابقه فشار خونی را ذکر نمی‌کند و هیچ علامت بالینی دیگری ندارد. وی در کدام دسته قرار می‌گیرد؟
الف) هیپرتانسیون مزمن (ب) هیپرتانسیون دلتا (ج) هیپرتانسیون حاملگی (د) پره‌اکلامپسی
- ۳- در خانم مبتلا به پره‌اکلامپسی بستری در بخش، اولین علامت بهبودی کدام است؟
الف) برگشت بینایی (ب) افزایش برون‌ده ادراری (ج) کاهش ادم (د) کاهش فشار خون
- ۴- کدام یک از الگوهای ضربان قلب جنین نشان دهنده اختلال عملکرد جفت است؟
الف) Bradycardia (ب) Variable Deceleration (ج) Beat to Beat Variability (د) Late Deceleration
- ۵- خانمی با شکایت درد شدید قسمت تحتانی شکم، درد گردن و شانه مخصوصاً هنگام دم به کلینیک مراجعه می‌کند. در تاریخچه، خانم ۸ هفته تأخیر در پرئود را ذکر می‌کند. تشخیص شما چیست؟
الف) حاملگی نابجا (ب) سقط (ج) مول (د) کیست تخمدان
- ۶- خانم ۲۰ ساله سه ماه بعد از سقط به شما مراجعه می‌کند و اظهار می‌دارد که به دنبال سقط ۸ هفته‌ای تا کنون خونریزی او قطع نشده است. اولین اقدام شما چیست؟
الف) کورتاژ تشخیصی (ب) سنجش میزان بتا HCG سرم (ج) سونوگرافی ترانس واژینال (د) تجویز یک دوره پروژسترون
- ۷- خانم مبتلا به نئوپلازی تروفوبلاستیک حاملگی که بیماری به آدنکس، واژن و لیگامان پهن متاستاز داده است، در کدام مرحله بیماری دارد؟
الف) I (ب) II (ج) III (د) IV
- ۸- شایع‌ترین علت کواگولوپاتی مصرفی بالینی شدید در مامایی کدام است؟
الف) جنین مرده (ب) آمبولی مایع آمنیوتیک (ج) شوک سپتیک (د) دکولمان