

برنام آنگدجان را کفرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 معاونت آموزشی
 دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
 مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
 سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه مامایی

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه							رشته امتحانی
زبان عمومی	روانپزشکی در مامایی	اختلالات جنسی	بیماریهای داخلی و جراحی	مربوط به مامائی	جنین شناسی	نوزادان و مراقبتهای مربوطه	
۴	۰	۲	۱	۲	۲	۴	مامایی
۴	۲	۱	۰	۲	۴	۳	مشاوره در مامایی

مجموعه مامایی

iranpuyesh.ir

مشخصات داوطلب:	تعداد سوالات:	۱۶۰ سوال
نام و نام خانوادگی:	زمان پاسخگویی:	۱۶۰ دقیقه
شماره کارت:	تعداد صفحات:	۲۰ صفحه

داوطلب عزیز
خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

استفاده از ماشین حساب معمولی مجاز نمی باشد.

بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان

- ۱- در بارداری، کدامیک از پارامترهای تنفسی تقریباً بدون تغییر می‌ماند؟
 الف) ظرفیت تمام ریه ب) ظرفیت باقیمانده عملکردی ج) ظرفیت دمی د) حجم ذخیره بازدمی
- ۲- در سونوگرافی خانم باردار ۲۴ هفته G2,P1,L1 با سابقه یک زایمان قبلی ۳۹ هفته در دو سال قبل، وزن تقریبی جنین، ۶۴۰ گرم، پرزانتاسیون متغیر و طول سرویکس، ۲۲ میلی‌متر گزارش شده است. اقدام مناسب چیست؟
 الف) ادامه مراقبت‌ها تا هفته ۳۰ بارداری
 ب) سرکلاژ واژینال
 ج) سرکلاژ ابدومینال
 د) تجویز پروژسترون
- ۳- در سونوگرافی خانم G3P2Ab0 در هفته ۳۹؛ قرار طولی، جفت قدامی و گرید ۳ و وزن تقریبی جنین، ۳۸۵۰ گرم گزارش شده است. احتمال وقوع کدام وضعیت زیر برای عضو نمایش، بیشتر است؟
 الف) بریج ب) ROP ج) LOT د) ROT
- ۴- در پلویمتری از یک خانم ۳۰ ساله نولی‌پار، قطر بین خارهای ایسکیال، ۹ سانتی‌متر و کونژوگه دیاگونال، ۱۰/۵ سانتی‌متر است. کدام گزینه در مورد وضعیت لگن با احتمال بیشتری مطرح می‌شود؟
 الف) لگن طبیعی
 ب) تنگی ورودی لگن
 ج) تنگی میانی لگن
 د) تنگی همزمان ورودی و میانی لگن
- ۵- در روند اداره مرحله سوم زایمان، پس از ۱۵ دقیقه از خروج نوزاد ۳۵ هفته، علائمی از خروج جفت مشاهده نمی‌شود. کدام اقدام توصیه می‌شود؟
 الف) ماساژ رحم و همزمان کشش خفیف بندناف
 ب) درمان انتظاری تا ۱۵ دقیقه دیگر
 ج) خروج دستی جفت
 د) تجویز میزوپروستول
- ۶- در مشاوره شیردهی به مادر ۳۰ ساله با تشخیص سل ریوی تحت درمان، کدام توصیه صحیح است؟
 الف) دوشیدن و دور ریختن شیر تا اتمام دوره درمان آنتی‌بیوتیکی
 ب) استفاده همزمان شیر مادر با شیرخشک
 ج) قطع تغذیه با شیرمادر
 د) ادامه تغذیه با شیرمادر
- ۷- خانم ۲۲ ساله در هفته ۲۸ بارداری، G2P0Ab1 با شکایت تهوع، سردرد و درد زیر استرنوم و علائم حیاتی پایدار مراجعه کرده است، نتایج آزمایشات: Hb: ۱۱/۵ g/dl ، Creatinine: ۰/۹ mg/dl و Plt: ۹۰۰۰۰/micro liter است. مناسب‌ترین اقدام کدام است؟
 الف) ارجاع فوری به متخصص جهت مشاوره گوارش
 ب) شروع مجدد تغذیه وریدی و پایش حرکات جنین
 ج) تجویز سولفات منیزیم و درخواست آزمایش کامل ادرار
 د) تجویز متوکلوپرامید و درخواست مجدد CBC