

صبح جمعه
۱۴۰۳/۰۳/۱۱

برنام آنکرجان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه مامایی

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه							رشته امتحانی
زبان عمومی	روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی	بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی	جنین شناسی	نوزادان و مراقبتهای مربوطه	بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده	بارداری و زایمان و بیماریهای زنان	
۴	۰	۲	۱	۲	۲	۴	مامایی
۴	۲	۱	۰	۲	۴	۳	مشاوره در مامایی

مجموعه مامایی

iranpuyesh.ir

مشخصات داوطلب: تعداد سوالات: ۱۶۰ سوال
نام و نام خانوادگی: زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه
شماره کارت: تعداد صفحات: ۲۲

داوطلب عزیز
خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.
استفاده از ماشین حساب معمولی مجاز نمی باشد.

بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان

- ۱- کدام عضله از قدام به کلیتوریس و در خلف به جسم پرینه متصل بوده و در آزاد شدن ترشحات غدد بارتولن و نعوظ کلیتوریس کمک می‌کند؟
- (الف) پرینه‌ای عرضی سطحی
(ب) ایسکیوکاورنوزوس
(ج) بولبو اسپونژیوس
(د) گلوئتوس ماگزیموس
- ۲- در مورد برونده قلب مادر طی بارداری، گزینه غلط کدام است؟
- (الف) در وضعیت ایستاده افت پیدا می‌کند.
(ب) در سه ماهه سوم افزایش بیشتری دارد.
(ج) در مرحله اول زایمان افزایش می‌یابد.
(د) در وضعیت خوابیده به پهلو افزایش می‌یابد.
- ۳- خانم باردار ۲۰ ساله G1P0، ۲۴ هفته با سابقه دو دوره درمان باکتیریوری در دوران حاملگی، برای سومین ویزیت پره ناتال خود مراجعه کرده است. در کشت ادرار وی بیش از ۱۰۰/۰۰۰ باسیل گرم منفی گزارش شده و در حال حاضر علائمی ندارد. کدامیک از روش‌های درمانی زیر صحیح است؟
- (الف) نیتروفوران‌توئین ۱۰۰ میلی‌گرم هنگام خواب در مدت باقی مانده حاملگی
(ب) نیتروفوران‌توئین ۱۰۰ میلی‌گرم چهار بار در روز به مدت ۲۱ روز
(ج) آموکسی‌سیلین ۳ گرم به صورت دوز واحد
(د) آموکسی‌سیلین ۵۰۰ میلی‌گرم ۳ بار در روز
- ۴- خانم باردار ۳۹ هفته و ۵ روز، به دنبال لکه‌بینی و احساس خیس شدن در واژن، بلافاصله به بیمارستان مراجعه کرده است. برای بررسی پارگی کیسه آب، دقت کدامیک از روش‌های تشخیصی زیر کمتر است؟
- (الف) بررسی با اسپکولوم (ب) تست فرن (ج) آمنی‌شور (د) تست نیترازین
- ۵- کدام گزینه در مورد تشخیص زود هنگام سقط فراموش شده صحیح است؟
- (الف) سونوگرافی ترانس ابدومینال به ترانس واژینال ارجح است.
(ب) از سونوگرافی داپلر ضربانی برای بررسی رویان استفاده شود.
(ج) تصویربرداری M-Mode برای ثبت و سنجش ضربان قلب استفاده شود.
(د) در اسکن سونوگرافی ابتدایی ساک حاملگی با کیسه زرده دیده می‌شود.
- ۶- در خانمی با بارداری لوله‌ای تحت درمان با متوترکسات، کدام گزینه صحیح است؟
- (الف) همزمان از مکمل‌های اسید فولیک استفاده شود.
(ب) متوترکسات از طریق کلیه پاکسازی می‌شود.
(ج) توصیه می‌شود در معرض نور خورشید قرار گیرند.
(د) فعالیت جنسی خطری ایجاد نمی‌کند.
- ۷- کدام اقدام درمانی در بارداری با مول کامل صحیح است؟
- (الف) هیستروتومی
(ب) القای لیبر
(ج) شیمی درمانی پروفیلاکتیک پس از تخلیه مول
(د) تجویز ایمنوگلوبولین آنتی D به واجدین شرایط