

برنام آنگه جان را قدرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵
سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مجموعه مامایی

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه							رشته امتحانی
زبان عمومی	روانپزشکی درمایی و اختلالات جنسی	بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامائی	جنین شناسی	نوزادان و مراقبتهای مربوطه	بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده	بارداری و زایمان و بیماریهای زنان	
۲	۰	۲	۱	۲	۲	۴	مامایی
۲	۲	۱	۰	۲	۴	۳	مشاوره در مامایی

مجموعه مامائی

مشخصات داوطلب:	تعداد سوالات: ۱۶۰ سوال
نام و نام خانوادگی:	زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه
شماره کارت:	تعداد صفحات: ۲۰

داوطلب عزیز
خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان

- ۱- کدامیک از عبارات زیر در مورد قدرت کششی آمنیون صحیح است؟
 الف) کیسه آمنیون تا سه برابر اندازه طبیعی، کش می‌آید.
 ب) کاهش پروتئوگلیکان‌ها عملکرد پرده‌های جنینی را مختل می‌کند.
 ج) منحصر به لایه متراکم است که از مقادیر زیادی از کلاژن‌های نوع V و VI تشکیل می‌شود.
 د) در محل پوشاننده سرویکس، منطقه‌ای از نظر بروز لنفوسیت‌ها وجود دارد که آبشار التهابی را مهار می‌کند.
- ۲- کالج متخصصین زنان، کدام اقدام را در جنین‌های مبتلا به اختلال رشد توصیه می‌کند؟
 الف) منحنی‌های رشد مختص هر جنین تهیه شود.
 ب) قبل از زایمان، وضعیت سلامت جنین با پروفایل بیوفیزیکی بررسی شود.
 ج) در صورت وجود الیگوهایدرامنیوس، زایمان بین هفته‌های ۳۵ تا ۳۶ انجام شود.
 د) توقف رشد جنین به صورت وزن برآورد شده جنین، کمتر از صدک ۵ در نظر گرفته شود.
- ۳- خانمی حین زایمان دچار آسیب بولب و سستیبول شده است، برای کشف همتوم احتمالی ناشی از آن بررسی کدام قسمت ضروری است؟
 الف) فضای عمقی مثلث اوروژنیتال
 ب) فضای سطحی مثلث اوروژنیتال
 ج) حفرات ایسکیوآنال مثلث مقعدی
 د) پشت کانال مقعدی و حفره لگن
- ۴- در سونوگرافی ۳۲ هفته خانم باردار، جنین نرمال با وزن تقریبی ۱۹۰۰ گرم و $AFI = 4\text{ cm}$ گزارش شده است، کدام اقدام توصیه می‌شود؟
 الف) بررسی رشد داخل رحمی با سونوگرافی
 ب) هیدراسیون خوراکی یا داخل وریدی
 ج) اقدام به ختم بارداری
 د) انجام آمنیوآنفوزیون
- ۵- خانم $G3Ab3$ جهت مشاوره پیش از بارداری مراجعه کرده است، تمام اقدامات زیر توصیه می‌شود، بجز:
 الف) سونوگرافی با انفوزیون سالین (SIS)
 ب) بررسی میزان هورمون پرولاکتین
 ج) تعیین کاریوتیپ هر دو والدین
 د) بررسی میزان پروتئین C و S
- ۶- در پیگیری پس از سقط مشکوک به مول هیداتیفرم، در چه صورت احتمال GTN مطرح می‌شود؟
 الف) پایدار ماندن مقدار HCG در سه اندازه‌گیری اول
 ب) مقادیر قابل شناسایی در ۶ هفته اول پس از تخلیه رحم
 ج) مقادیر قابل شناسایی HCG سرم به مدت ۶ ماه پس از ختم بارداری
 د) عدم کاهش اندازه رحم در سه هفته اول پس از زایمان همراه با لکه بینی
- ۷- خانم $G3P2$ ، ۱۸ هفته مبتلا به هیپرتانسیون مزمن، با شکایت اضافه وزن ناگهانی مراجعه کرده است، در حال حاضر فشار خون وی ۱۴۵/۹۵ است. طبق توصیه ACOG برای پیشگیری از پره‌اکلامپسی، کدام مورد تا پایان بارداری تجویز می‌شود؟
 الف) کلسیم از هفته ۲۰
 ب) آسپرین از همین سن
 ج) ویتامین C از هفته ۲۰
 د) ویتامین E از همین سن