

پنج شنبه

۱۴۰۴/۰۸/۰۸

کد ۱۰۳

مجموعه بهداشت باروری (بهداشت باروری، مامایی)

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

رشته: مجموعه بهداشت باروری

(بهداشت باروری، مامایی)

مجموعه بهداشت باروری			
دروس امتحانی و ضرایب مربوطه			
بارداری و زایمان		بهداشت باروری	
ضریب	تعداد سوال	ضریب	تعداد سوال
۴	۵۰	۶	۵۰
۶	۵۰	۴	۵۰
		بهداشت باروری	
		مامایی	

تعداد سوالات: ۱۳۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۲

مشخصات داوطلب:

نام:

نام خانوادگی:

iranpuyesh.ir

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

بهداشت باروری

- ۱- در نتایج آزمایش غربالگری نوبت دوم پاشنه پای نوزاد نارس، میزان TSH مساوی $6/3 \text{ mIU/L}$ گزارش شده است. اقدام بعدی کدام است؟
 - الف) ارجاع برای انجام آزمایش وریدی
 - ب) انجام آزمایش ماهانه تا ۶ ماهگی
 - ج) طبیعی است و نیاز به اقدام خاصی ندارد
 - د) تشخیص هیپوتیروئیدی و شروع درمان
- ۲- در واکسیناسیون نوزاد HIV مثبت ثابت شده با آزمون‌های ویروس‌شناسی، کدام اقدام توصیه می‌شود؟
 - الف) تجویز دوز صفر واکسن سرخک در ۱۲ ماهگی
 - ب) ممنوعیت تجویز واکسن خوراکی فلج اطفال در تمامی این نوزادان
 - ج) تزریق واکسن مننگوکوک کنژوگه ۴ یا ۵ ظرفیتی حداقل از سن ۲ ماهگی کودک
 - د) تعویق تزریق واکسن MMR تا بعد از ۱۸ ماهگی در صورت سرکوب شدید سیستم ایمنی
- ۳- برای مقایسه نمرات عزت نفس گروه مورد تحقیق در نوبت‌های قبل، بلافاصله بعد و ۸ هفته بعد از اتمام مداخله، چنانچه در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف $P=0.01$ گزارش شده باشد، آزمون آماری مناسب کدام است؟
 - الف) ANOVA با اندازه‌های تکراری
 - ب) کروسکال-والیس
 - ج) کوکران
 - د) فریدمن
- ۴- کدام مورد بر اساس «دستورالعمل اجرایی ترویج زایمان طبیعی موضوع ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صحیح است؟
 - الف) تعداد مادران باردار در هر جلسه کلاس آمادگی برای زایمان باید حداکثر ۱۰ نفر باشد.
 - ب) افزایش پوشش کلاس‌های آمادگی برای زایمان باید به میزان ۱۰۰ درصد مادران باردار تا پایان سال ۱۴۰۴ باشد.
 - ج) مسئولیت مامای شیفت، ثبت تمامی مراقبت‌ها در حین فرایند زایمان بوده و مسئولیت مهر و امضای آن با پزشک است.
 - د) ارزشیابی عملکرد بیمارستان‌ها بر اساس کاهش سالانه ۱۲ درصد از میزان سزارین نسبت به نرخ کل زایمان خواهد بود.
- ۵- معمولاً علت آغاز یا موافقت برای فعالیت جنسی در زنان چیست؟
 - الف) افزایش نزدیکی احساسی با همسر
 - ب) عرف پذیرفته شده زندگی زناشویی
 - ج) ارضاء هویت زنانه
 - د) تجربه ارگاسم
- ۶- ویاال‌های آماده شده واکسن روتاویروس، MMR، ب.ث.ژ و آبله مرغان که مصرف نشده‌اند، به ترتیب چند ساعت پس از آماده سازی باید دور ریخته شوند؟
 - الف) ۶، ۶، ۴ و ۰/۵
 - ب) ۰/۵، ۶، ۰/۵ و ۴
 - ج) ۶، ۰/۵، ۴ و ۶
 - د) ۶، ۰/۵، ۶ و ۴