



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

۷

۸

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۵-۹۶

رشته: فارج شناسی پزشکی

فارج شناسی پزشکی

تعداد سوالات:	۱۵۰
زمان:	۱۵۰ دقیقه
تعداد صفحات:	۱۶

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز

لطفاً قبل از شروع پاسخگویی،

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرارداده
و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

۷

۸

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.



قارچ‌شناسی

۱ - در کریپتوکوزیس میزان ارتشاح لکوسیت‌ها به کانون عفونت چگونه است؟

- الف) تعداد لکوسیت‌ها معمولاً تا $mm^3 / 800$ سلول افزایش می‌یابد.
- ب) ارتشاح لکوسیتی انحصاراً از نوع نوتروفیلی است.
- ج) ارتشاح لکوسیتی از نوع اوزینوفیلی است.
- د) تعداد لکوسیت‌ها تا $mm^3 / 100$ سلول کاهش می‌یابد.

۲ - تمامی قارچ‌های زیر نسبت به داروهای گروه پلی‌ان مقاومت نشان می‌دهند، بجز؟

- الف) آسپرژیلوس فلاووس
- ب) سدوسپوریوم اپیوسپریوم
- ج) فوزاریوم سولانی
- د) ترایکوسپورون بژلی

۳ - بطور کلی در اکثر موارد انتوموفتورومایکوزی عودکننده از چه دارویی استفاده می‌شود؟

- الف) یدوریتابسیم
- ب) فلوسیتیزین
- ج) آمفوتیریسین B
- د) کوتیریماکسازول

۴ - در منژیت کوکسیدیوئیدومایکوزیس کدام‌یک از موارد ذیل صحیح است؟

- الف) تست منفی تحریک لنفوسیت توسط کوکسیدیوئیدین
- ب) تست پوسیتی مثبت با اسفلولین
- ج) تیتر پایین آنتی‌بادی سرم
- د) تیتر بالای آنتی‌بادی فیکساسیون کمپلمان سرم و مایع نخاعی

۵ - در بین قارچ‌های مهم از نظر پزشکی زیر، کدام‌یک هموتالیک بوده و تولید کلیستوتیشیوم می‌کند؟

- الف) میکروسپوروم کانیس
- ب) بلاستومایسنس درماتیتیدیس
- ج) سدوسپوریوم اپیوسپریوم
- د) هیستوپلاسم کپسولاتوم

۶ - عامل شایع اتیولوژی عفونت قارچی سینوس پارانازال در ایران کدام است؟

- الف) هیستوپلاسم کپسولاتوم
- ب) کونیدیوبولوس کوروناتوس
- ج) آسپرژیلوس فلاووس
- د) ترایکوسپورون بژلی

۷ - کدام گزینه در مورد کوکسیدیوئیدومایکوزیس صحیح است؟

- الف) بیماری منتشره بیشتر در مردان سفیدپوست در مقایسه با سیاه‌پوستان گزارش می‌شود.
- ب) عفونتی غیرآشکار و خودبخود محدود شونده در نواحی اندمیک است.
- ج) با مشاهده آرتروکونیدی در نمونه بالینی تشخیص داده می‌شود.
- د) به دنبال عفونت اولیه، اریتماندوزوم در مردان بیش از زنان مشاهده می‌شود.