

لا بد کرو... تعلمئن القلوب

جمعه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۳۸۸/۸/۸

معاونت آموزشی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سؤالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته: اعضاي مصنوعي

سال تحصيلي ۸۸-۸۹

تعداد سوالات: ۱۵۰

زمان: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۸

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزيز لطفاً قبل از شروع پاسخگوئي، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولين جلسه اطلاع دهيد.

مرکز سنجش آموزش پزشکي

دانشگاه
پژوهش
و فناوری
طب اسلامی

ارتز

- سؤال ۱ - کدامیک از روش‌های ذیل برای به دست آوردن شکل (Impression) سطح پلانتار در حالت تحمل وزن نسبی مناسب‌تر است؟
- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Synthetic casting tape (ب) | Low density Polyurethane foam (الف) |
| Plaster bandage (د) | Noncontact scanning (ج) |

- سؤال ۲ - علت کاهش فاصله بین بارهای Paraspinal در قسمت فوقانی TLSO چیست؟
- | | |
|----------------------------------|---|
| ب) تبعیت از کاهش عرض تنہ مهره‌ها | الف) تأمین ثبات بیشتر در قسمت Thoracic |
| د) بهبود جنبه ظاهری ارتز | ج) عدم تداخل در حرکت Retraction اسکپولا |

- سؤال ۳ - همه موارد زیر معمولاً از خصوصیات Early-onset idiopathic scoliosis می‌باشد، بجز:
- | |
|---|
| الف) در دختران شایع‌تر است. |
| ب) در ۶ ماهه اول زندگی تشخیص داده می‌شود. |
| ج) الگوی آن انحراف چپ در توراسیک است. |
| د) گاهی بخودی خود اصلاح می‌گردد. |

- سؤال ۴ - همه جملات زیر در درمان ارتزی کایفوز صحیح است، بجز:
- | |
|---|
| الف) TLSO ترمопلاستیک به روش Passive اصلاح ایجاد می‌کند. |
| ب) در میلواکی انتقال حلقه گردنی به عقب سبب افزایش نیروهای اصلاحی می‌گردد. |
| ج) عدم وجود انعطاف در کایفوز سبب ممنوعیت تجویز ارتز می‌گردد. |
| د) رینگ گردنی Lower profile برای انحنای mid thoracic مناسب است. |

- سؤال ۵ - در آسیب whiplash در محدوده C₃ تا C₇ کدام مورد تجویز می‌گردد؟
- | | |
|-----------------|------------------|
| Soft collar (ب) | Halo vest (الف) |
| Surgery (د) | Rigid collar (ج) |