

اپتومتری بالینی و بیماری‌های چشم

۱. کدامیک از آزمون‌های زیر، ارزیابی غربال‌گری کمی از اختلال دید رنگ کودکان قبل از سن مدرسه انجام می‌دهد؟
الف) PV-16 (ب) FM100 (ج) A.O. 23 (د) Cardiff 35
۲. کدامیک از پلیمرهای زیر در ساخت عدسی‌های تماسی نوزادان و کودکان استفاده مناسب‌تری دارد؟
الف) Betaflicon A (ب) Hema (ج) silicon elastomer (د) Simflicon B
۳. کدامیک از موارد زیر در نوزادان ایجاد آنومالی‌های اربیت نمی‌کند؟
الف) blastoma syndrome (ب) Goldenhar syndrome (ج) Apert syndrome (د) Plagiccephaly
۴. جهت غربال‌گری دید بعد در کودکان کدامیک از موارد زیر به عنوان آزمون مرجع در این زمینه محسوب می‌شود؟
الف) T.N.O (ب) MCT (ج) RDS (د) MUH
۵. کدام گزینه زیر، استاندارد مرجع برای سایکلورفرکشن را بیان می‌نماید؟
الف) ۱۰ دوز آتروپین (ب) ۳ دوز هماتروپین (ج) ۳ دوز سایکلوپنتولات (د) ۳ دوز میدریاکس
۶. براساس Stiles -Crawford effect کدامیک از موارد زیر باعث کاهش تیزبینی می‌شود؟
الف) آستیگمات مایل (ب) آستیگمات مخالف قاعده (ج) high myopia (د) high hyperopia
۷. تریزومی ۱۸ باعث کدامیک از اختلالات زیر می‌شود؟
الف) سندرم ادوارد (ب) سندرم patau (ج) گالاکتوزمی (د) سندرم فریاد گربه‌ای
۸. مانور Doll's Head برای ارزیابی کدام ویژگی زیر انجام می‌شود؟
الف) تیزبینی (ب) سیستم وستیبولار (ج) درک عمقی (د) دید بعد
۹. براساس معیارهای موجود حداقل میزان آنیزومتروپی که ممکن است شانس ایجاد آمبلیوپی داشته باشد چقدر است؟
الف) بیش‌تر از ۱ دیوپتر (ب) بیش از ۱,۵ دیوپتر (ج) بیش از ۲ دیوپتر (د) بیش از ۲,۵ دیوپتر