

پنجمین

۱۳۹۰/۸/۵

«به نام او که آرامش بخش دلهاست»

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته: سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سال تحصیلی ۹۰-۹۱

تعداد سوالات: ۱۰۰

زمان: ۱۰۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۴

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت

مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

iranpuyesh.ir

دندانپزشکی کودکان

سوال ۱ - کدامیک از مواد غذایی زیر باعث کاهش pH اینترپروگزیمال (تا حد زیر ۵/۵) نمی‌شود؟

- (الف) نان گندم کامل
- (ب) هویج خام
- (د) مرکبات
- (ج) چیپس سیب‌زمینی

سوال ۲ - کودکی که در منطقه فلورایده زندگی می‌کند، در ۶ ماه گذشته دچار پوسیدگی شده است و همچنین دارای Gingivitis می‌باشد در چه گروهی از CAT قرار می‌گیرد؟

- (الف) Low risk
- (ب) Moderate risk
- (ج) High risk
- (د) با اطلاعات فوق نمی‌توان گروه‌بندی خاصی را قائل شد.

سوال ۳ - اندوکاردیت باکتریائی پس از اعمال دندانپزشکی معمولاً توسط کدام گروه از میکرووارگانیسم‌ها ایجاد می‌شود؟

- (الف) استرپتوکک بتا همولیتیک
- (ب) استرپتوکک ویریدنس
- (ج) استافیلوکک آلفا همالیتیک
- (د) استافیلوکک بتا همولیتیک

سوال ۴ - در مقایسه شیر انسان و گاو کدام عبارت درست است؟

- (الف) شیر گاو شیرین‌تر از شیر انسان است.
- (ب) توانایی بافرینگ شیر انسان بسیار بالاتر است.
- (ج) شیر گاو محتوی پروتئین بیشتری دارد.
- (د) شیر انسان کلسیم و فسفر بیشتری دارد.

سوال ۵ - در کودکی ۵ ساله که دچار نارسایی مزمن کلیوی است انجام فلورایدترابی موضعی و کاربرد فلوراید سیستمیک به ترتیب اندیکاسیون:

- (الف) دارد - ندارد
- (ب) ندارد - دارد
- (ج) ندارد - ندارد

سوال ۶ - همه عبارات زیر در مورد ژنثیو استوماتیت هرپتیک (PHG) و هرپس سیمپلکس راجعه (RHS) صحیح است، بجز:

- (الف) ویروس هرپس سیمپلکس نوع II می‌تواند سبب PHG شود
- (ب) حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد بیماران مبتلا به PHG دچار RHS می‌شوند
- (ج) درمان دندانپزشکی بیماران مبتلا به RHS می‌باشد تا بهبودی بیماری به تأخیر افتد
- (د) درمان PHG آنتی بیوتیک کاربردی ندارد

سوال ۷ - کدام عبارت در مورد بیماری Riga.fede غلط است؟

- (الف) ممکن است باعث خونریزی شود
- (ب) یکی از راههای درمانی observation است
- (د) زخم در سطح شکمی و پشتی زبان ایجاد می‌شود
- (ج) قطع تغذیه از شیر مادر می‌تواند کمک کننده باشد