

الا بذکرا... قطمئن القلوب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته: سلامت دهان

سال تحصیلی ۹۱-۹۲

تعداد سوالات: ۱۰۰

زمان: ۱۰۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۶

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز

لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

iranpuyesh.ir

دندانپزشکی کودکان

سوال ۱ – در همه سندروم‌های زیر هم دندان اضافی و هم فقدان دندانی ممکن است مشاهده شود جز سندروم.....
که فقط دندان اضافی دیده می‌شود.

- (الف) Down syndrome
- (ب) Crouzon syndrome
- (ج) Oral-Facial digital syndrome
- (د) Gardner syndrome

سوال ۲ – **Peak** وقوع لوسمی لنفوسيتيک حاد در سن..... بوده و یکی از شایع‌ترین علائم دهانی در هنگام تشخيص..... می‌باشد.

- (الف) ۳ سالگی – درد ناحیه حلقی
- (ب) ۴ سالگی – زخم گلو (Sore throat)
- (ج) ۲ سالگی – خونریزی از لثه
- (د) ۴ سالگی – تورم فکی

سوال ۳ – همه عبارات زیر در مورد **Localized aggressive periodontitis** در دندان‌های دائمی صحیح است، جز:

- (الف) از دست رفتن استخوان در اطراف دندان مولر اول دیده می‌شود
- (ب) آماس ایجاد شده در اطراف دندان‌ها به دلیل شدت تخریب استخوان بیش از بیماران مبتلا به نوتروپنی است
- (ج) بر اساس مطالعات گذشته نگر ریشه بیماری در دندان‌های شیری است
- (د) صفت اتوژوم غالب برای انتقال ارثی آن مطرح شده است

سوال ۴ – در مورد عادات دهانی کدام جمله صحیح است؟

- (الف) عادات مکیدن انگشت معمولاً زودتر از عادت مکیدن پستانک ترک می‌شوند
- (ب) والدین باید بدانند در چند ماهه اول کاربرد Palatal crib اختلال در صحبت کردن و خواب به وجود می‌آید و بعد برطرف می‌شود
- (ج) Palatal crib در کودکانی استفاده می‌شود که هیچ کراس بایت خلفی نداشته باشند
- (د) حرکت لبیولینگوآلی انسیزورها را در هنگام عادت به مصرف پستانک معمولاً به اندازه عادت به مکیدن انگشت است

سوال ۵ – شیوع رویش ناچای دندان مولر اول دائمی چه میزان گزارش شده است؟

- (د) ۶ درصد
- (ب) ۶ - ۴ درصد
- (ج) ۴ - ۳ درصد
- (الف) ۱ درصد

سوال ۶ – کدام دوره سنی از جهت تجویز فلوراید بسیار مهم است؟

- (د) ۱۲ - ۶ سالگی
- (ب) ۶ - ۲ سالگی
- (ج) ۶ - ۴ سالگی
- (الف) ۲ - ۱ سالگی

سوال ۷ – هدف اولیه از درمان صدمات منجر به لقی دندان‌های دائمی چیست؟

- (الف) برقراری ثبات و Fixation
- (ب) حفظ وايتاليتی پالپ
- (ج) حفظ حیات PDL
- (د) جلوگیری از انکیلوز