

دندان پزشکی کودکان

۱. در مورد primary failure of eruption کدام گزینه صحیح است؟
- (الف) حداقل دو دندان مولر اول دائمی درگیر می‌شود.
 (ب) دندان‌های واقع در مزیال مولرهای اول درگیر می‌شوند.
 (ج) این بایت پیشرونده در این بیماران دیده می‌شود.
 (د) اکستروژن ارتودنسی بهترین گزینه درمانی است.
۲. در بررسی ریسک پوسیدگی کودک ۳ ساله‌ای که نیاز به مراقبت‌های سلامت ویژه دارد و روی دندان‌های سانتراال پلاک دندانی دارد، در کدام گروه ریسک پوسیدگی قرار می‌گیرد؟
- (الف) ریسک بالا
 (ب) ریسک متوسط
 (ج) ریسک پایین
 (د) با این داده نمی‌توان ارزیابی کرد
۳. در مورد معاینه دهانی نوزاد کدام گزینه صحیح نیست؟
- (الف) روش مطلوب در معاینه نوزاد موقعیت زانو به زانو است.
 (ب) در معاینه نوزاد استفاده از یونیت دندانپزشکی غیر ضروری است.
 (ج) کودک ممکن است گریه کند که مفید و کمک کننده است.
 (د) والدین تنها می‌توانند نقش بی‌حرکت کننده کودک را داشته باشند.
۴. در مورد پیش‌گیری از سمیت فلوراید در کودکان کدام مورد صحیح است؟
- (الف) تجویز مکمل فلوراید در هر بار نباید از ۴۰ mg بیشتر شود.
 (ب) تجویز مکمل فلوراید در هر بار نباید از ۳۰ mg بیشتر شود.
 (ج) تجویز فلوراید تغلیظ شده موضعی خانگی باید به ۱۲۰ ml محدود شود.
 (د) تجویز فلوراید تغلیظ شده موضعی خانگی باید به ۳۰-۴۰ ml محدود شود.
۵. هدف اصلی در مدیریت و درمان همه صدمات لوکسیشن کدام است؟
- (الف) برقراری خونرسانی به بافت لثه‌ای
 (ب) بازگرداندن دندان به موقعیت اصلی
 (ج) حفظ حیات لیگامان پیوندنتال
 (د) حفظ حیات پالپ دندان
۶. به عنوان خصوصیات تکاملی در رابطه با دندانپزشکی به ترتیب از راست به چپ در کودک ۳ ساله - ۴ ساله - ۶ ساله چه نوع ترسی وجود دارد؟
- (الف) ترس بصری - ترس از آسیب بدنی - ترس شنیداری
 (ب) ترس بصری - ترس شنیداری - ترس از آسیب بدنی
 (ج) ترس شنیداری - ترس بصری - ترس از آسیب بدنی
 (د) ترس شنیداری - ترس از آسیب بدنی - ترس بصری