

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و

مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

رشته: سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی

تعداد سؤالات: ۱۰۰

زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۴

دروس مورد آزمون:

دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی ترمیمی

پریودانتیکس

دندانپزشکی اجتماعی

\* سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی در دفترچه جداگانه ارائه می شود.

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی:

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت

وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

### دندان پزشکی کودکان

۱- در کدامیک از بیماری‌های زیر هایپرسمنتوزیس دیده می‌شود؟

- الف) اپیدمولیزبولوزا
- ب) کلیدوکرانیال دیسپلازی
- ج) آترواسکلروزیس
- د) هیپوفسفاتازیا

۲- در کاربرد سیلور دیامین فلوراید (SDF) چه موادی بر روی سطح دندان رسوب می‌کنند؟

- الف) کلسیم فلوراید و سیلور فسفات
- ب) سیلور فسفات و سیلور فلوراید
- ج) کلسیم فلوراید و سیلور فلوراید
- د) سیلور فسفات و سدیم فلوراید

۳- کدام عبارت در ارتباط با Riga-Fede disease صحیح است؟

- الف) باعث خون‌ریزی فعال نمی‌شود.
- ب) یکی از راه‌های درمانی، observation است.
- ج) تنها راه درمانی قطع تغذیه از شیر مادر است.
- د) زخم در سطح شکمی و پشتی زبان ایجاد می‌گردد.

۴- کودکی ۲ ساله در منطقه با آب حاوی PPM ۰/۵ فلوراید زندگی می‌کند. میزان مکمل فلوراید مورد نیاز کودک چقدر است؟

- الف) ۰ mg/d
- ب) ۰/۲۵ mg/d
- ج) ۰/۵ mg/d
- د) ۱ mg/d

۵- کودک ۵ ساله‌ای بر اثر ضربه دچار لترال لوکسیشن دندان سانترال بالا و جابجایی دندان به سمت پالاتال شده است. اگر کودک فردای حادثه مراجعه کرده و در معاینه بالینی تداخل اکلوزالی مشاهده شود ولی شکستگی زائده آلوئول مشاهده نشود، طرح درمان پیشنهادی شما کدام است؟

- الف) کشیدن دندان
- ب) بازگرداندن دندان به محل اصلی و اسپلینت
- ج) عدم جابجایی دندان و فالوآپ
- د) حذف تداخلات اکلوزالی و فالوآپ

۶- تاخیر تکاملی کدام دسته از کودکان ۴ برابر سایرین است؟

- الف) کودکان با رفتار Disruptive
- ب) کودکان زودرس
- ج) کودکان با ترس Auditory
- د) کودکان با ترس Visual

۷- کدامیک از عبارات زیر در مورد کاربرد فلوراید در بیماران خاص نادرست است؟

- الف) برای فلورایدتراپی در بیماران با مشکلات پزشکی جهت افزایش سرعت عمل از تری یک بار مصرف استفاده شود.
- ب) در کودکان با ناتوانی پزشکی کاربرد فلوراید با روش معمول محدودیت دارد.
- ج) در کودکانی که تحت رادیوتراپی هستند بهتر است از ژل APF استفاده نشود.
- د) در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کلیوی بروز پوسیدگی کمتر بوده و فلوراید سیستمیک توصیه نمی‌شود.