

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)
سال تحصیلی ۹۴ - ۹۵

رشته: کاردرمانی

تعداد سوالات:	۱۵۰
زمان:	۱۵۰ دقیقه
تعداد صفحات:	۲۰

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز

لطفاً قبل از شروع پاسخگویی،
دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده
و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

روانشناسی و روانپزشکی

۱- کدام یک از موارد زیر جزء داروهای توهم زا نیست؟

- الف) مسکالین ب) ال-اس-دی ج) هروئین د) PCP (فن سیکلیدین)

۲- در ادراک پریشی تداعی Associative Agnosia که افراد تنها با دیدن اشیاء نمی توانند آنها را باز شناسی کنند، کدام قسمت مغز آسیب دیده است؟

- الف) لوب فرونتال یا پیشانی
ب) لوب پره فرونتال (پیش پیشانی)
ج) قطعه گیجگاهی یا تمپورال
د) لوب پس سری یا اکسی پیتال

۳- از نظر پیاژه، کودک در چه مرحله رشدی به پایداری شیء می رسد؟

- الف) عملیات عینی (۷ تا ۱۱ سالگی)
ب) حس حرکتی (تولد تا ۲ سالگی)
ج) پیش عملیاتی (۲ تا ۷ سالگی)
د) عملیات صوری (۱۱ سالگی به بعد)

۴- رویکر پردازش اطلاعات Information Processing از کدام دیدگاه نشأت گرفت؟

- الف) دیدگاه بقراط که علاقه وافری به فیزیولوژی داشت.
ب) دیدگاه دکارت که بدن آدمی را ماشینی می دانست که مثل هر ماشین دیگری قابل بررسی است.
ج) دیدگاه جان لاک که معتقد بود دانش از طریق تجربه ها و تعامل های آدمی با جهان کسب می شود.
د) دیدگاه ویلهلم وونت که معتقد بود ذهن و رفتار را نیز همانند سیاره ها و مواد شیمیایی می توان با روش های علمی بررسی و تحلیل کرد.

۵- کدام یک از تیپ های شخصیتی زیر در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به افسردگی می باشد؟

- الف) ضد اجتماعی
ب) پارانوئید
ج) اسکیزوتایپ
د) وسواسی - جبری

۶- کدام یک از دو نوروترانسمیتر زیر بیشترین نقش را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارند؟

- الف) گلوتامات - سروتونین
ب) نوراپی نفرین - سروتونین
ج) نوراپی نفرین - گلوتامات
د) گابا GABA و گلیسین

۷- کدام یک از دلایل مصرف بالای سیگار در بیماران اسکیزوفرن نیست؟

- الف) ناهنجاری های گیرنده های نیکوتینی مغز
ب) کاهش دادن غلظت خونی داروهای ضد روانپریشی
ج) بهبود برخی تخریب های روانشناختی و پارکینسونیسم بیماران
د) تأثیر بر گیرنده های نیکوتینی و کاهش علائم مثبت مثل توهمات