

## کاردرمانی در بیماری‌ها

۱. در شرایط dual task اولویت دادن به task دوم در کدام افراد رخ می‌دهد؟  
 الف) پارکینسون (ب) آتاکسی (ج) DCD (د) جوانان سالم
۲. بیمارانی که دچار ضایعه در مسیر نخاعی مخچه‌ای لوب قدامی هستند، نوسانات پوسچرال غیر طبیعی ..... در حالت ایستاده را نشان می‌دهند.  
 الف) به جلو و عقب (ب) به راست و چپ (ج) به سمت مبتلا (د) در همه جهات
۳. در مداخلات کاردرمانی نوجوانان، از تحریکات لمسی و ماساژ برای کاهش کدامیک از موارد زیر می‌توان استفاده کرد؟  
 الف) Hostility (ب) Social withdrawal (ج) Suicidal ideation (د) Self-Mutilation
۴. هنگامی که درمانگر به بیمار مبتلا به درد مزمن کمک می‌کند تا با کارفرمای خود تماس تلفنی گرفته و در مورد مشکلات محل کار صحبت کند، براساس مدل intentional relationship از کدامیک از حالت‌های بین فردی استفاده کرده است؟  
 الف) collaborating (ب) Advocating (ج) Encouraging (د) Empathizing
۵. در کدامیک از انواع نظارت (Supervision) بر جنبه‌های intrapersonal در آموزش تاکید می‌شود؟  
 الف) Psychodynamic Supervision (ب) Humanistic or Person-Centered Supervision (ج) Cognitive-Behavioral Supervision (د) Developmental Approaches to Supervision
۶. هنگام ارزشیابی عضلانی اکستانسورهای زانو کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟  
 الف) تغییر وضعیت بیمار از نشسته تا خوابیده به پهلو  
 ب) اعمال مقاومت بالای مچ در کل دامنه اکستنشن  
 ج) حفظ hip در کمی abd بدون چرخش  
 د) لمس سطح داخلی، قدامی و خارجی میانه ران
۷. کدام گزینه علامت آسیب به عصب رادیال در سطح پایین است؟  
 الف) فلج بین استخوانی قدامی، انحراف رادیال حین فلکشن مچ  
 ب) فلج بین استخوانی خلفی، انحراف رادیال حین فلکشن مچ  
 ج) فلج بین استخوانی قدامی، انحراف رادیال حین اکستنشن مچ  
 د) فلج بین استخوانی خلفی، انحراف رادیال حین اکستنشن مچ