

برنام آنگر جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی  
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)  
سال تحصیلی ۹۶-۹۷

رشته: **مطالعات اعتیاد**

تعداد سئوالات: ۱۵۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۸

مشخصات داوطلب:

نام: .....

نام خانوادگی: .....

مطالعات اعتیاد

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی،

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

iranpuyesh.ir

## اختلالات روانپزشکی

- ۱- از نوروترانسمیترهای مسئول در اختلالات روان پزشکی کدام یک در گروه کاتکل آمین ها قرار نمی گیرد؟  
الف) دوپامین      ب) سروتونین      ج) استیل کولین      د) نوراپی نفرین
- ۲- خانم جوانی به شما ارجاع شده است. طبق شرح حال این خانم مدت ها است که از دست اعضای خانواده غذایی مصرف نمی کند. شب ها نمی خوابد و مرتب با خودش حرف می زند. در این مراجع از نظر علامت شناسی روان پزشکی کدام مورد بیشتر مطرح است؟  
الف) دچار توهم است.  
ب) هذیان دارد.  
ج) دچار disorganized speech است.  
د) دچار disorganized behavior است.
- ۳- آقای ۴۰ ساله ای به شما مراجعه می کند. بیمار افسرده، بی انرژی، دچار کاهش خواب و اشتها شده است. علامت اخیر از یک ماه قبل شروع شده است. در سابقه بیمار یک دوره بستری به دلیل پرحرفی، کاهش نیاز به خواب، پرخاشگری در بیمارستان روان پزشکی را دارد. مناسب ترین تشخیص برای این فرد ..... است.  
الف) اختلال افسردگی اساسی  
ب) اختلال دوقطبی نوع یک  
ج) اختلال اسکیزوافکتیو  
د) اختلال اسکیزوفرنی فرم
- ۴- در مورد فردی که معتقد است «مردم در مورد او صحبت می کنند» و «مجری تلویزیون به رفتارهای او اشاره دارد» کدام اختلال زیر بیشتر مطرح است؟  
الف) توهم خودبزرگ بینی  
ب) اختلال حافظه و توجه  
ج) هذیان ارجاع  
د) هذیان بی وفایی
- ۵- در مسمومیت با مواد محرک کدام علائم روان پزشکی بیشتر قابل انتظار است؟  
الف) سایکوز      ب) خلقی      ج) شناختی      د) اضطرابی
- ۶- در مورد اختلال اسکیزوفرنیا کدام مورد درست است؟  
الف) برای تشخیص وجود توهم و هذیان ضروری است.  
ب) شیوع اسکیزوفرنیا در مردان در سنین بالاتر است.  
ج) زنان در سنین پایین تری شانس ابتلا به اختلال را دارند.  
د) پیش آگهی اسکیزوفرنیا در زنان بهتر از مردان است.
- ۷- برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی وجود کدام علامت ضروری است؟  
الف) کاهش خواب      ب) کاهش علاقه      ج) افزایش اشتها      د) خلق تحریک پذیر